

Текст примерного типового задания:

1. Аптечка «антиспид» должна находиться

- А) в каждом лечебном кабинете
- Б) только в хирургическом кабинете
- В) в кабинете старшей мед.сестры
- Г) в регистратуре
- Д) в кабинете главного врача

Ответ: а

2. При попадании крови пациента на слизистую рта медицинского персонала необходимо

- А) Прополоскать рот 70% спиртом
- Б) Прополоскать рот 0,05% раствором марганцовокислого калия
- В) Обработать слизистую 5% раствором йода
- Г) Прополоскать рот 1% раствором борной кислоты
- Д) Физ раствором

Ответ: а

3. Медицинская карта стоматологического больного (форма №043/у) оформляется в медицинской организации на пациента

- А) при первичном обращении
- Б) при каждом обращении
- В) один раз в год
- Г) один раз в пять лет
- Д) дважды в год

Ответ: а

4. Сколько должно быть врачей-стоматологов-хирургов для организации хирургического отделения:

- А) пять**
- Б) шесть**
- В) четыре**
- Г) три**
- Д) два**

Ответ: в

5. Количество раковин в стоматологическом кабинете

- А) одна
- Б) две
- В) три
- Г) ни одной
- Д) четыре

Ответ: б

6. Вентиляция в основной (заготовочной) комнате

- А) вытяжной
- Б) приточной
- В) приточно-вытяжной
- Г) не имеет значения
- Д) крышной

Ответ: в

7. Стены кабинета для амбулаторного хирургического приема покрыты

- А) побелкой
- Б) водно-дисперсионной краской
- В) обоями
- Г) стеклообоями
- Д) керамической плиткой

Ответ: д

8. Площадь операционной не менее

- А) 7 м² на 1 кресло
- Б) 15 м² на 2 кресла
- В) 23 м² на 1 кресло
- Г) 24 м² на 2 кресла
- Д) 33 м² на 2 кресла

Ответ: а

9. В стоматологических поликлиниках при наличии хирургического кабинета имеется не менее

- А) трех помещений
- Б) двух помещений
- В) пяти помещений.
- Г) одного помещения
- Д) шести помещений

Ответ: а

10. Операционная с одним стоматологическим креслом занимает

- А) 23 м²
- Б) 21 м²
- В) 14 м²
- Г) 20 м²
- Д) 22 м²

Ответ: а

11. Короткая уздечка языка в грудном возрасте влияет на

- А) процесс приема пищи
- Б) процесс дыхания
- В) определение вкуса
- Г) произношение звуков
- Д) рост нижней челюсти

Ответ: а

12. Как называется операция по удлинению уздечки языка

- А) френулотомия
- Б) френулотомия
- В) френулобиопсия
- Г) френулоглоссия
- Д) остеотомия

Ответ: б

13. Короткая уздечка верхней губы приводит к

- А) кариесу
- Б) тремам
- В) диастеме
- Г) нарушению произношения звуков
- Д) неправильному прикусу

Ответ: в

14. В каком возрасте рекомендовано проводить пластику уздечки верхней губы

- А) 1 год
- Б) 3 года
- В) 5 лет
- Г) 7-8 лет
- Д) 15 лет

Ответ: г

15. К новообразованиям полости рта относится

- А) ретенционная киста

- Б) сверхкомплектный зуб
- В) декубитальная язва
- Г) свищевой ход
- Д) хейлит

Ответ: а

16. На какое исследование отправляют образцы после удаления новообразований

- А) цитологическое
- Б) химический анализ
- В) гистологическое
- Г) рентгенологическое
- Д) ультразвуковое

Ответ: в

17. На каких зубах наиболее чаще всего проводится операция резекция верхушки корня

- А) молочных зубах
- Б) клыках и резцах
- В) премолярах
- Г) молярах
- Д) зубах мудрости

Ответ: б

18. Основным методом лечения кист челюстей небольшого размера является:

- А) цистэктомия
- Б) криодеструкция
- В) склерозирование
- Г) частичная резекция челюсти
- Д) выскабливание через лунку удаленного зуба

Ответ: а

19. Укажите зуб, подлежащий операции резекции верхушки корня

- А) клык верхней челюсти с непроходимым каналом корня в его средней трети и щелевидным дефектом наружной компактной пластинки по всей длине корня
- Б) 38 зуб с очагом деструкции имеющим четкие границы
- В) 41 зуб с подвижностью 3-ей степени
- Г) 21 зуб с выведенным пломбирочным материалом в периодонтальную гранулему
- Д) 16 зуб с кистогранулемой небного корня

Ответ: г

20. Какой врач направляет на операцию пластика уздечки верхней губы

- А) ортодонт
- Б) логопед
- В) ЛОР врач
- Г) невролог
- Д) стоматолог ортопед

Ответ: а

21. Воспаление периодонта какого зуба чаще всего осложняется периоститом челюсти:

- А) центрального резца
- Б) клыка
- В) второго премоляра
- Г) третьего моляра
- Д) первого моляра

Ответ: г

22. Общим обезболиванием является

- а) внутривенный наркоз
- б) стволовая анестезия
- в) спинальная анестезия

г) паранефральная блокада

Ответ: а

23.

Для ингаляционного наркоза используется

а) калипсол

б) фторотан

в) дроперидол

г) оксибутират натрия

Ответ: б

24. Жидкое наркотическое средство,
используемое для ингаляционного наркоза,

а) фторотан

б) калипсол

в) циклопропан

г) закись азота

Ответ: а

25. Способом неингаляционного наркоза является

а) масочный

б) внутривенный

в) эндотрахеальный

Ответ: б

26. Для неингаляционного наркоза применяется

а) эфир

б) фторотан

в) сомбревин

г) закись азота

Ответ: в

27. Для неингаляционного наркоза применяется

а) эфир

б) трилен

в) гексенал

г) закись азота

Ответ: в

28. Для неингаляционного наркоза применяется

а) эфир

б) кетамин

в) хлороформ

г) закись азота

Ответ: б

29. Наркозом, используемым при длительных и травматических операциях, является

а) масочный

б) внутривенный

в) электронаркоз

г) эндотрахеальный

Ответ: г

30. При нейролептаналгезии препараты вводят

а) энтерально

б) внутривенно

в) ингаляционно

г) внутримышечно

Ответ: б

31. Препараты, используемые для нейролептаналгезии

- а) промедол, трентал
- б) циклопропан, морфин
- в) гексенал, сомбревин
- г) дипидолор, пенталгин
- д) фентанил, дроперидол

Ответ: д

32. Атаралгезией называется

- а) разновидность нейролептаналгезии
- б) самостоятельный способ обезболивания
- в) способ проведения ингаляционного наркоза
- г) способ проведения неингаляционного наркоза

Ответ: а

33. Для проведения атаралгезии применяют препараты группы

- а) седативных
- б) снотворных
- в) транквилизаторов

Ответ: в

34. Для проведения атаралгезии применяют препараты группы

- а) наркотиков
- б) анальгетиков
- в) атарактиков

35. Показанием к проведению общего обезболивания является

- а) травматичность операции
- б) длительность вмешательства
- в) нарушения психики больного
- г) всё перечисленное

Ответ: г

36. Противопоказанием к проведению общего обезболивания является

- а) полный желудок
- б) аллергия к местным анестетикам
- в) неуравновешенность психики больного

Ответ: а

37. Нижняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва

- а) I-й
- б) II-й
- в) III-й

Ответ: в

38. Верхняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва

- а) I-й
- б) II-й
- в) III-й

Ответ: б

39. Верхнечелюстной нерв выходит из полости черепа

- а) через сонное отверстие
- б) через овальное отверстие
- в) через остистое отверстие
- г) через круглое отверстие

Ответ: г

40. При туберальной анестезии наступает блокада верхних луночковых ветвей

- а) задних
- б) средних
- в) передних

Ответ: а

41. В зону обезболивания при туберальной анестезии входят зубы

- а) 876
- б) 8
- в) 54
- г) 87654
- д) 76

Ответ: а

42. При инфраорбитальной анестезии наступает блокада верхних луночковых ветвей

- а) средних и задних
- б) передних и задних
- в) передних и средних

Ответ: в

43. В зону обезболивания верхней челюсти при инфраорбитальной анестезии входят

- а) моляры
- б) верхняя губа, крыло носа
- в) 4321, слизистая оболочка альвеолярного отростка с небной стороны
- г) 4321, слизистая оболочка альвеолярного отростка с вестибулярной стороны
- д) верно б) и г)

Ответ: д

44. При анестезии у большого небного отверстия наступает блокада

- а) носонебного нерва
- б) большого небного нерва
- в) среднего верхнего зубного сплетения

Ответ: б

45. В зону обезболивания при анестезии у большого небного отверстия входят слизистая оболочка твердого неба от третьего моляра и

- а) до клыка
- б) до первого резца
- в) до первого премоляра

Ответ: а

46. В зону обезболивания при анестезии у резцового отверстия входят слизистая оболочка альвеолярного отростка от резцов до клыков

- а) с небной стороны
- б) с вестибулярной стороны
- в) с вестибулярной и небной сторон

Ответ: а

47. Нижнечелюстной нерв является ветвью тройничного нерва

- а) I-ой
- б) II-ой
- в) III-ей

48. Нижнечелюстной нерв выходит из полости черепа через отверстие

- а) сонное
- б) круглое
- в) овальное
- г) остистое

Ответ: в

49. Двигательная порция нижнечелюстного нерва представлена

- а) n.massetericus
- б) n.auriculotemporalis

- в) n.temporalis profundus anterior
- г) n.temporalis profundus medius
- д) верно а), в), г)

Ответ: д

50. Анатомическим ориентиром при проведении мандибулярной анестезии внутриротовым способом является

- а) моляры
- б) височный гребешок
- в) позадиомолярная ямка
- г) крыловиднонижнечелюстная складка
- д) всё перечисленное

Ответ: д

51. К внеротовому способу мандибулярной анестезии относится обезболивание

- а) торусальная
- б) подскуловая по Егорову
- в) из поднижнечелюстной области

Ответ: в

52. При торусальной анестезии происходит блокада нервов

- а) язычного и щечного
- б) язычного и нижнелуночкового
- в) язычного, щечного и нижнелуночкового
- г) язычного, нижнелуночкового и подбородочного

Ответ: в

53. В зону обезболивания при анестезии щечного нерва входят слизистая оболочка щеки и альвеолярной части нижней челюсти от середины коронки второго моляра и

- а) до клыка
- б) до первого резца
- в) до первого премоляра

Ответ: в

54. При анестезии язычного нерва вкол иглы производят в слизистую оболочку челюстно-язычного желобка на уровне

- а) первого моляра
- б) второго моляра
- в) третьего моляра

Ответ: в

55. Стволовая анестезия нижнечелюстного нерва проводится

- а) у сонного отверстия
- б) у овального отверстия
- в) у остистого отверстия
- г) у круглого отверстия

Ответ: б

56. Выключение двигательных волокон нижнечелюстного нерва проводится

- а) при рубцовой контрактуре
- б) при вправлении скуловой кости
- в) при воспалительной контрактуре

Ответ: в

57. Целью проведения анестезии по Берше является блокада

- а) язычного и нижнелуночкового нервов
- б) язычного, щечного и нижнелуночкового нервов
- в) двигательных волокон тройничного нерва

Ответ: в

58. Стволовая анестезия показана при вмешательствах на челюстях

- а) малотравматичных
- б) длительных
- в) травматичных
- г) верно б) и в)

Ответ: г

59. При стволовой анестезии зона обезболивания включает

- а) зубы
- б) всю половину челюсти
- в) слизистую оболочку челюсти

Ответ: б

60. Стволовая анестезия верхнечелюстного нерва проводится

- а) у сонного отверстия
- б) у овального отверстия
- в) у остистого отверстия
- г) у круглого отверстия

Ответ: г

61. Стволовая анестезия нижнечелюстного нерва проводится

- а) у сонного отверстия
- б) у овального отверстия
- в) у остистого отверстия
- г) у круглого отверстия

Ответ: б

62. Ориентиром для проведения стволовой анестезии II и III ветвей тройничного нерва служит

- а) подвисочный гребень
- б) передний край жевательной мышцы
- в) наружная пластинка крыловидного отростка клиновидной кости

Ответ: в

63. Для проведения стволовой анестезии используют иглу длиной

- а) 3-4 см
- б) 7-8 см
- в) 10-15 см

Ответ: б

64. Ориентиром вкола иглы при анестезии верхнечелюстного нерва по Вайсблату служит

- а) суставной бугорок
- б) скулоальвеолярный гребень
- в) середина трагоорбитальной линии

Ответ: в

65. Местное осложнение после проведения проводникового обезболивания

- а) неврит
- б) невралгия
- в) вазопатия

Ответ: а

66. Непосредственным местным осложнением стволовой анестезии является

- а) обморок
- б) повреждение лицевой артерии
- в) попадание иглой в полость носа
- г) гематома

Ответ: г

67. Непосредственным общим осложнением местной анестезии является

- а) обморок

- б) гематома
 - в) контрактура
68. Токсичность местных анестетиков проявляется
- а) при гипертиреозе
 - б) при увеличении концентрации анестетика
 - в) при попадании анестетика в кровяное русло
 - г) верно всё перечисленное

Ответ: г

69. Непосредственные общие осложнения, возникающие при передозировке анестетика
- а) тризм
 - б) двигательное возбуждение, судороги
 - в) гиперемия в области введения анестетика

Ответ: б

70. Обморок - это
- а) проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания
 - б) аллергическая реакция на антиген
 - а) потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса

Ответ: в

71. При передозировке адреналина больному необходимо ввести
- а) внутривенно 1 мл атропина
 - б) внутривенно 1 мл мезатона
 - в) внутримышечно 1 мл норадреналина

Ответ: а

72. Во время коллапса сознание
- а) сохранено
 - б) не сохранено

Ответ: а

73. Коллапс - это
- а) аллергическая реакция на антиген
 - б) потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса
 - в) проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания

Ответ: в

74. Во время коллапса кожные покровы
- а) сухие, бледные
 - б) влажные, бледные
 - в) сухие, гиперемированные
 - г) влажные, гиперемированные

Ответ: б

75. Пульс во время коллапса
- а) частый, нитевидный
 - б) нитевидный, редкий
 - в) частый, хорошего наполнения
 - г) редкий, хорошего наполнения

Ответ: а

76. Артериальное давление во время коллапса
- а) повышено
 - б) понижено

77. Дыхание во время коллапса
- а) глубокое
 - б) поверхностное

Ответ: б

78. При подозрении на развитие у больного анафилактического шока

на введенный анестетик, проводимая терапия должна включать в себя препараты

- а) аналептики
- б) гормональные
- в) антигистаминные
- г) антигистаминные и аналептики
- д) антигистаминные и гормональные
- е) антигистаминные, аналептики и гормональные

Ответ: е

79. Анафилактический шок - это

- а) потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса
- б) наиболее тяжелая аллергическая реакция на антиген
- в) проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания

Ответ: б

80. Интенсивная терапия в послеоперационном периоде осуществляется

- а) стоматологом
- б) средним медицинским персоналом
- в) врачами специализированной службы

Ответ: в

81. Количество толчков в одну минуту при проведении непрямого массажа сердца

- а) 30
- б) 60
- в) 90

Ответ: б

82. При проведении непрямого массажа сердца руки реаниматора располагаются

- а) на эпигастрии
- б) на нижней трети грудины
- в) на средней трети грудины

Ответ: б

83. При наступлении клинической смерти внутрисердечно вводят раствор адреналина гидрохлорида

- а) 1%
- б) 10%
- в) 0.1%

84. К общесоматическим осложнениям местного обезболивания относят

- а) синусит
- б) альвеолит
- в) остеомиелит
- г) анафилактический шок

Ответ: г

85. Мягкая одонтома относится к группе

- а) предраков
- б) воспалительных заболеваний
- в) опухолеподобных образований
- г) злокачественных одонтогенных опухолей
- д) доброкачественных одонтогенных опухолей

Ответ: д

86. Наиболее часто мягкая одонтома локализуется в области

- а) нижних моляров
- б) верхних моляро
- в) нижних премоляров
- г) резцов нижней челюсти
- д) резцов верхней челюсти

Ответ: в

87. Клиническая картина мягкой одонтомы характеризуется

- а) безболезненной деформацией челюсти в виде вздутия
- б) рыхлым болезненным кровоточащим образованием десны
- в) плотным болезненным инфильтратом в области нескольких зубов
- г) плотным безболезненным инфильтратом в области нескольких зубов
- д) 2-3 эрозиями десны, без тенденции к кровоточивости и эпителизации

Ответ: а

88. Окончательный диагноз "мягкая одонтома" ставится на основании данных

- а) опроса
- б) цитологии
- в) гистологии
- г) анализов крови
- д) клинико-рентгенологического исследования

Ответ: в

89. Мягкую одонтому следует дифференцировать

- а) с гемангиомой
- б) с пародонтитом
- в) с амелобластомой
- г) с полиморфной аденомой
- д) с остеомиелитом челюсти

Ответ: в

90. Мягкую одонтому следует дифференцировать

- а) с гемангиомой
- б) с пародонтитом
- в) с полиморфной аденомой
- г) с остеомиелитом челюсти
- д) с гигантоклеточной опухолью

Ответ: д

91. Мягкую одонтому следует дифференцировать

- а) с миксомой
- б) с пародонтитом
- в) с гемангиомой
- г) с полиморфной аденомой
- д) с остеомиелитом челюсти

Ответ: а

92. Основным методом лечения мягкой одонтомы является

- а) цистэктомия
- б) химиотерапия
- в) лучевая терапия
- г) резекция челюсти
- д) выскабливание оболочки новообразования

Ответ: г

93. Синоним мягкой одонтомы

- а) цилиндрома
- б) амелобластома
- в) фиброзная бластома
- г) амелобластическая киста
- д) амелобластическая фиброма

Ответ: д

94. Рентгенологическая картина амелобластической фибромы характеризуется

- а) костными изменениями типа "тающего сахара"

- б) костными изменениями типа "матового стекла"
- в) резорбцией кортикальной пластинки челюсти на всем протяжении
- г) диффузной деструкцией губчатого вещества челюсти на всем протяжении
- д) кистозном очагом с четкими границами, в котором содержатся элементы зубных тканей

Ответ: д

95. Мягкая одонтома склонна к озлокачествлению с перерождением

- а) в остеосаркому
- б) в лимфосаркому
- в) в рак слизистой дна полости рта
- г) в амелобластическую фибросаркому

Ответ: г

96. Особенностью амелобластомы является способность

- а) к инвазивному росту
- б) к неинвазивному росту
- в) к метастазированию в отдаленные лимфоузлы
- г) к метастазированию в регионарные лимфоузлы

Ответ: а

97. Одонтома относится к группе

- а) воспалительных заболеваний
- б) опухолеподобных образований
- в) пороков развития зубных тканей
- г) злокачественных одонтогенных опухолей
- д) доброкачественных одонтогенных опухолей

Ответ: в

98. Гистологическое строение сложной одонтомы характеризуется

- а) отдельными зубоподобными структурами
- б) пролиферирующим одонтогенным эпителием
- в) разной степени минерализованной цементоподобной тканью
- г) тонкой фиброзной капсулой, выстланной ороговевающим плоским эпителием
- д) обызвествленными зубными тканями, расположенными хаотично, образующими единый конгломерат

Ответ: д

99. Гистологическое строение составной одонтомы характеризуется

- а) пролиферирующим одонтогенным эпителием
- б) разной степени минерализованной цементоподобной тканью
- в) отдельными зубоподобными структурами представляющими все ткани зуба
- г) тонкой фиброзной капсулой, выстланной ороговевающим плоским эпителием
- д) обызвествленными зубными тканями, расположенными хаотично, образующими единый конгломерат

Ответ: в

100. Клиническая картина сложной и составной одонтомы характеризуется

- а) свищами на коже
- б) контрактурой челюстей
- в) бессимптомным течением
- г) плотным болезненным инфильтратом в области нескольких зубов
- д) периодическими воспалительными реакциями в виде периостита

Ответ: в