

**ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИТОГОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 6 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА,
ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ**

1. В структуре причин смертности в России в настоящее время первое ранговое место принадлежит: (выберите один правильный ответ)

- а) злокачественным новообразованиям
- б) болезням системы кровообращения
- в) инфекционным и паразитарным болезням
- г) травмам и отравлениям
- д) болезням органов дыхания

2. В структуре причин инвалидности в России в настоящее время первое ранговое место принадлежит: (выберите один правильный ответ)

- а) злокачественным новообразованиям
- б) болезням системы кровообращения
- в) инфекционным и паразитарным болезням
- г) травмам и отравлениям
- д) болезням органов дыхания

3. Процесс формирования здорового образа жизни включает: 1) информирование населения о факторах риска; 2) формирование убежденности в необходимости сохранения здоровья; 3) повышение материального благосостояния; 4) воспитание навыков здорового образа жизни; 5) снижение показателя летальности. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 5
- в) 3, 4, 5
- г) 1, 2, 4
- д) 4, 5

4. Основными направлениями формирования здорового образа жизни являются: 1) создание и активизация позитивных для здоровья факторов; 2) повышение эффективности деятельности служб здравоохранения; 3) снижение уровня заболеваемости; 4) снижение уровня смертности; 5) минимизация и устранение факторов риска. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 5
- в) 3, 4, 5
- г) 1, 2, 4
- д) 1, 5

5. Обязательным условием формирования здорового образа жизни является: 1) рациональное индивидуальное поведение; 2) осуществление общегосударственных мероприятий по созданию здоровых условий жизни; 3) формирование установок на здоровье в обществе; 4) повышение эффективности диспансеризации; 5) снижение уровня заболеваемости. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 5
- в) 3, 4, 5
- г) 1, 2, 3
- д) 1, 5

6. Первичная профилактика включает: 1) проведение прививок; 2) мероприятия, предупреждающие развитие заболеваний; 3) выявление заболеваний; 4) мероприятия, предупреждающие развитие осложнений и рецидивов заболевания; 5) повышение материального благосостояния. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 5
- в) 3, 4, 5
- г) 1, 2, 3
- д) 1, 5

7. Вторичная профилактика включает: (выберите один правильный ответ)

- а) проведение прививок
- б) мероприятия, предупреждающие развитие заболеваний
- в) выявление заболеваний
- г) мероприятия, предупреждающие развитие осложнений и рецидивов заболевания
- д) повышение материального благосостояния

8. Врачи поликлиники выполняют следующие виды работы: 1) диагностику и лечение заболеваний; 2) профилактическую работу; 3) санитарно-просветительную работу; 4) противоэпидемическую работу; 5) ведение оперативно-учетной документации. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 5
- в) 3, 4, 5
- г) 1, 2, 3, 4, 5
- д) 1, 3, 4, 5

9. Организация диспансерного наблюдения включает: 1) активное выявление и взятие на учет больных и лиц с факторами риска; 2) активное динамическое наблюдение и лечение; 3) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий; 4) регулирование потока посетителей поликлиники; 5) анализ качества и эффективности диспансерного наблюдения. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 5
- в) 2, 3, 4, 5
- г) 1, 2, 3, 5
- д) 4, 5

10. Эффективность диспансерного наблюдения оценивается следующими показателями: 1) полнотой взятия на диспансерное наблюдение; 2) своевременностью взятия на диспансерное наблюдение; 3) летальностью; 4) кратностью обострений и заболеваний; 5) процентом перевода по группам диспансерного наблюдения. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 5
- в) 1, 2, 4, 5
- г) 1, 2, 3
- д) 4, 5

11. Право на получение листка нетрудоспособности имеют: 1) граждане Российской Федерации; 2) иностранные граждане, работающие в учреждениях РФ, независимо от форм собственности; 3) учащиеся средних учебных заведений; 4) безработные граждане, состоящие на учете в органах труда и занятости; 5) безработные граждане, не состоящие на учете в органах труда и занятости. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 5
- в) 3, 4, 5
- г) 1, 2, 4
- д) 4, 5

12. Право на выдачу листка нетрудоспособности имеют: 1) врачи санэпиднадзора; 2) врачи амбулаторно-поликлинических учреждений; 3) врачи бальнеогрязелечебниц; 4) врачи стационарных учреждений; 5) частнопрактикующие врачи, имеющие лицензию. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 5
- в) 3, 4, 5
- г) 1, 2, 4
- д) 2, 4, 5

13. Продление листка нетрудоспособности при заболеваниях и травмах свыше 15 дней осуществляет: (выберите один правильный ответ)

- а) лечащий врач
- б) заведующий отделением
- в) медицинская комиссия лечебно-профилактического учреждения
- г) главный специалист по экспертизе нетрудоспособности Минздрава РФ
- д) медико-социальная экспертная комиссия

14. Установление группы инвалидности осуществляет: (выберите один правильный ответ)

- а) лечащий врач
- б) заведующий отделением
- в) врачебная комиссия лечебно-профилактического учреждения
- г) главный специалист по экспертизе нетрудоспособности Минздрава РФ
- д) медико-социальная экспертная комиссия

15. Право на бесплатное лекарственное обеспечение имеют следующие категории граждан, относящиеся к «федеральным» льготникам (обеспечиваются льготами за счет средств федерального бюджета): 1) инвалиды войны; 2) участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами; 3) дети в возрасте до 6 лет; 4) неработающие граждане; 5) ветераны боевых действий. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 2, 5
- в) 3, 4, 5
- г) 1, 2, 3
- д) 2, 4, 5

16. Для прикрепления больного к аптеке по месту жительства для обеспечения его наркотическими лекарственными средствами оформляется: (выберите один правильный ответ)

- а) больничный лист
- б) письменное распоряжение руководителя лечебно-профилактического учреждения, зарегистрированное в установленном порядке
- в) решение врачебной комиссии
- г) заявление от онкобольного
- д) специальная справка из поликлиники

17. Для организации работы дневного стационара в его структуре рекомендуется предусматривать следующие помещения: 1) палаты в зависимости от коечной мощности, пост медицинской сестры; 2) процедурную; 3) операционную; 4) палату переливания крови; 5) прозектуру. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 5
- в) 3, 4, 5
- г) 1, 2, 3
- д) 4, 5

18. В течение амбулаторного периода наблюдения за больными, перенесшими миокардит, клиничко-электрокардиографическое и лабораторное обследования проводятся не менее, чем: (выберите один правильный ответ)

- а) 3-4 раза в год
- б) 6 раз в год
- в) не менее 2 раз в год

19. Врач-терапевт участковый должен знать: 1) основы законодательства РФ о здравоохранении; 2) нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений здравоохранения; 3) основы организации лечебно-профилактической помощи в больницах и амбулаторно-поликлинических учреждениях, учреждениях скорой и неотложной медицинской помощи, службе медицины катастроф; 5) Уголовный Кодекс РФ; 5) нормативную базу налогообложения. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 5
- в) 3, 4, 5
- г) 1, 2, 3
- д) 4,5

20. Документом, подтверждающим временную нетрудоспособность, является: 1) выписка из истории болезни стационарного больного; 2) справка станции скорой медицинской помощи; 3) индивидуальная программа реабилитации инвалида; 4) свидетельство об инвалидности; 5) лист временной нетрудоспособности (больничный лист). Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 5
- в) 3, 4, 5
- г) 1, 2, 3, 4
- д) 2, 5

21. На дому пневмонию лечат: (выберите один правильный ответ)

- а) у лиц с декомпенсированным сахарным диабетом
- б) у лиц с ХСН
- в) у пожилых пациентов с ХОБЛ
- г) у молодых больных при легком или среднетяжелом течении заболевания
- д) у молодых пациентов при наличии осложнений (плеврита, дыхательной недостаточности)

22. Отделение (кабинет) медицинской профилактики осуществляет: 1) организацию и проведение акций профилактической направленности; 2) организацию семинаров по вопросам охраны здоровья среди различных групп населения; 3) лечение хронических заболеваний у прикрепленного населения; 4) выдачу рекомендаций по коррекции здорового образа жизни; д) выдачу листов нетрудоспособности при эпидемиях ОРВИ. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2, 4
- б) 1, 3, 5
- в) 3, 4, 5
- г) 1, 2, 3
- д) 4, 5

23. Социальная профилактика включает: 1) проведение прививок; 2) проведение медицинских осмотров; 3) выявление заболеваний; 4) улучшение условий труда и отдыха; 5) повышение материального благосостояния. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 5
- в) 3, 4, 5
- г) 1, 2, 3
- д) 4, 5

24. Медицинская профилактика включает: 1) проведение прививок; 2) проведение медицинских осмотров; 3) выявление заболеваний; 4) улучшение условий труда и отдыха; 5) повышение материального благосостояния. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 5
- в) 3, 4, 5
- г) 1, 2, 3
- д) 4, 5

25. В стандарт оснащения дневного стационара терапевтического профиля: 1) набор хирургических инструментов; 2) набор для неотложной помощи; 3) набор для экстракции зуба; 4) ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер); 5) наркозный аппарат. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 5
- в) 3, 4, 5
- г) 1, 2, 3
- д) 2, 4

26. Выписывание льготных рецептов только по решению врачебной комиссии поликлиники осуществляется лечащим врачом: (выберите один правильный ответ)

- а) на анальгетики
- б) на антибиотики
- в) на инсулин
- г) на витамины
- д) на психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, анаболические гормоны

27. К методам и средствам первичной профилактики следует отнести: 1) раннюю диагностику заболеваний; 2) вакцинирование; 3) профилактическую госпитализацию; 4) оздоровление окружающей среды. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 4
- в) 3, 5
- г) 1, 2, 3
- д) 2, 4

28. Целью вторичной профилактики является предупреждение возникновения: 1) острых заболеваний; 2) осложнений заболеваний; 3) несчастных случаев; 4) хронических заболеваний. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3
- в) 1, 3, 4
- г) 1, 2, 3
- д) 2, 4

29. Категория «ребенок-инвалид» устанавливается: (выберите один правильный ответ)

- а) на 5 лет
- б) на 1 или 2 года либо до достижения гражданином возраста 18 лет
- в) всем до достижения 18 лет
- г) на 1 год
- д) на 2 года или пожизненно

30. Диспансеризация работающего населения осуществляется: (выберите один правильный ответ)

- а) ежегодно
- б) 1 раз в квартал

- в) 1 раз в 2 года
- г) 1 раз в 5 лет
- д) 1 раз в 3 года

31. Задачи врачебно-трудовой экспертизы: (выберите один правильный ответ)

- а) определение характера нетрудоспособности
- б) установление причин стойкой или временной нетрудоспособности
- в) изучение причин заболеваемости и инвалидности для разработки медицинских и социальных мероприятий
- г) все перечисленное верно
- д) ничего из перечисленного не верно

32. Сроки временной нетрудоспособности определяет: (выберите один правильный ответ)

- а) главный врач ЛПУ
- б) врачебная комиссия
- в) только узкий специалист
- г) участковый терапевт
- д) заведующий отделением

33. Лист временной нетрудоспособности может выдаваться при: 1) необходимости ухода за больным членом семьи; 2) уходе за здоровым ребенком и ребенком-инвалидом, на период карантина; 3) отпуске по беременности и родам; 4) протезировании в условиях протезно-ортопедического стационара; 5) нахождении в доме отдыха. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 2, 3, 4
- в) 3, 4, 5
- г) 1, 2, 3
- д) 4, 5

34. Функции листа временной нетрудоспособности: 1) государственная; 2) юридическая; 3) финансовая; 4) статистическая; 5) диагностическая. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 5
- в) 3, 4, 5
- г) 2, 3, 4
- д) 4, 5

35. Больным дилатационной кардиомиопатией с сердечной недостаточностью II и III функциональных классов по NYHA определяется: (выберите один правильный ответ)

- а) I группа инвалидности
- б) II группа инвалидности
- в) III группа инвалидности

36. Стандарт оснащения кабинета врача общей практики, семейного врача, оказывающий амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи: 1) измеритель артериального давления, сфигмоманометр; 2) стетофонендоскоп; 3) набор диагностический для офтальмоскопии и оториноскопии; 4) набор реанимационный; 5) небулайзер. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 5
- в) 3, 4
- г) 1, 2, 3
- д) 4, 5

37. Пациент трудоспособного возраста при наличии у него признаков гриппа считается: (выберите один правильный ответ)

- а) трудоспособным
- б) временно нетрудоспособным
- в) частично трудоспособным
- г) инвалидом
- д) тяжелым инкурабельным пациентом

38. Лист временной нетрудоспособности единолично врач имеет право выписать на срок: (выберите один правильный ответ)

- а) 5 дней
- б) 10 дней
- в) 15 дней
- г) 20 дней
- д) 30 дней

39. Временная нетрудоспособность – это:

- а) состояние организма человека, обусловленное заболеванием или травмой, при котором нарушение функций организма сопровождается невозможностью выполнения профессионального труда в обычных производственных условиях в течение ограниченного промежутка времени
- б) болезнь, при которой выполнение любого труда невозможно
- в) нарушение функции одной из систем организма
- г) утрата конечности
- д) состояние организма человека, требующее пребывания на дому

40. Ориентировочные сроки назначения антибиотиков при пневмонии:

- а) до нормализации температуры
- б) до полного рассасывания инфильтрата в легком
- в) до нормализации СОЭ
- г) до 4- 5 дней стойко нормальной температуры тела
- д) до момента исчезновения кашля

41. Здоровые лица, подлежащие диспансеризации: 1) лица, в силу своего образа жизни способные получить хроническое заболевание; 2) лица, которые в силу своих физиологических особенностей требуют систематического наблюдения за состоянием здоровья (дети, подростки, беременные женщины); 3) лица, испытывающие воздействие неблагоприятных факторов производственной среды; 4) спецконтингент (лица, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС); 5) хронические больные. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 5
- в) 3,4, 5
- г) 2, 3, 4
- д) 4, 5

42. Цели диспансеризации здоровых: 1) сохранение здоровья и трудоспособности; 2) выявление факторов риска развития заболеваний и их устранение; 3) предупреждение возникновения заболеваний и травм путем осуществления профилактических и оздоровительных мероприятий; 4) своевременное хирургическое лечение; 5) профориентация. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 5
- в) 3, 4, 5
- г) 1, 2, 3
- д) 4, 5

43. Диспансерное наблюдение в поликлинике больных включает: 1) больных с хроническими заболеваниями; 2) здоровых с факторами риска хронических болезней; 3) реконвалесцентов после некоторых острых заболеваний; 4) больных с врожденными (генетическими) заболеваниями и пороками развития; 5) детей и стариков. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 4
- в) 3, 4, 5
- г) 1, 2, 3
- д) 4, 5

44. Анемия у беременных чаще всего является: (выберите один правильный ответ)

- а) апластической
- б) фолиеводефицитной
- в) железодефицитной
- г) постгеморрагической
- д) токсической

45. Периодические профилактические осмотры проводятся: 1) при приеме на работу; 2) рабочих промышленных предприятий с вредными и опасными условиями труда; 3) работников ведущих профессий сельскохозяйственного производства; 4) инвалидов детства; 5) детей и подростков, юношей допризывного возраста. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 5
- в) 3, 4, 5
- г) 2, 3, 5
- д) 4, 5

46. Принципы отбора лиц, подлежащих диспансеризации: (выберите один правильный ответ)

- а) социальный и медицинский
- б) медицинский и финансовый
- в) профессиональный и национальный
- г) возрастной и половой
- д) административный и религиозный

47. 1 группа диспансерного наблюдения. Выберите один правильный ответ:

- а) здоровые: осмотр не менее 1 раза в год
- б) практически здоровые: осмотр 1-2 раза в год (угрожаемые по хронической патологии, частые ОРВИ, как первичная профилактика ХНЗЛ)
- в) больные, имеющие хронические заболевания в стадии компенсации (обострения редкие, лечение эффективно, вне обострения сохраняют трудоспособность). Осмотр 2 раза в год
- г) больные, имеющие хронические заболевания в стадии субкомпенсации. Осмотр 4 раза в год
- д) больные, имеющие хронические заболевания в стадии декомпенсации

48. 4 группа диспансерного наблюдения. Выберите один правильный ответ:

- а) практически здоровые: осмотр 1-2 раза в год (с хроническими заболеваниями в стадии стойкой ремиссии без функциональных нарушений)
- б) здоровые: осмотр не менее 1 раза в год
- в) больные, имеющие хронические заболевания в стадии компенсации (обострения редкие, лечение эффективно, вне обострения сохраняют трудоспособность). Осмотр 2 раза в год
- г) больные, имеющие хронические заболевания в стадии декомпенсации
- д) больные, имеющие хронические заболевания в стадии субкомпенсации

49. Варианты реабилитации: 1) адаптация реабилитанта на прежнем рабочем месте; 2) реадаптация – работа на новом рабочем месте с измененными условиями труда, но на том же

предприятия; 3) работа на новом месте в соответствии с приобретенной новой квалификацией, близкой к прежней специальности, но отличающейся пониженной нагрузкой; 4) переквалификация в любую интересную для пациента профессию; 5) работа на неполный рабочий день. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 5
- в) 3, 4, 5
- г) 1, 2, 3
- д) 4, 5

50. Основные направления медицинской реабилитации: 1) ранняя диагностика болезни (травмы); 2) своевременная госпитализация; 3) полноценное лабораторно-инструментальное обследование; 4) раннее комплексное лечение (режим, диета, медикаменты и др.); 5) контроль динамики болезненного процесса и эффективности лечения. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 5
- в) 3, 4, 5
- г) 1, 2, 3, 4, 5
- д) 4, 5

51. Больничный лист в установленном порядке выдается: (выберите один правильный ответ)

- а) гражданам, признанным безработными и состоящим на учете в государственных учреждениях службы занятости населения
- б) уволенным по статье «служебное несоответствие»
- в) неработающим застрахованным лицам
- г) женщинам, находящимся в декретном отпуске
- д) здоровым на время трудового отпуска

52. Артериальной гипертензией беременных называется: (выберите один правильный ответ)

- а) АД выше 120/80 мм рт.ст, выявленное на любом сроке беременности
- б) повышение АД после 20-й недели беременности выше 140/90 мм рт ст
- в) артериальная гипертензия, выявленная сразу после родоразрешения
- г) высокое АД, выявленное у беременной с патологией почек на 5-15 неделе беременности
- д) гипертонический криз на любом сроке беременности

53. Профилактика развития и прогрессирования диабетической нефропатии сводится: (выберите один правильный ответ)

- а) к контролю уровня гликемии
- б) к коррекции гипертонии
- в) к назначению инсулина
- г) к назначению малобелковой диеты
- д) ко всему перечисленному

54. Рекомендуемым жаропонижающим препаратом при лечении ОРВИ у беременных является: (выберите один правильный ответ)

- а) ацетилсалициловая кислота (аспирин)
- б) ацетаминофен (парацетамол)
- в) кеторолак (кеторол)
- г) осельтамивир (тамифлю)
- д) чай с малиной

55. Лейкоцитурия у беременных в отсутствии признаков инфекционно-воспалительного поражения почек наблюдается: (выберите один правильный ответ)

- а) всегда

- б) никогда
- в) у части пациенток (10%)
- г) у большинства пациенток

56. Если у беременной нет экстрагенитальной патологии, она осматривается терапевтом: (выберите один правильный ответ)

- а) каждый месяц
- б) не осматривается ни разу
- в) осматривается трижды за беременность
- г) осматривается в начале и в конце беременности
- д) осматривается однократно

57. При нормально протекающей беременности и отсутствии экстрагенитальной патологии беременная осматривается терапевтом: (выберите один правильный ответ)

- а) при постановке на учет в женскую консультацию
- б) при постановке на учет в женскую консультацию, в 32 и 36-37 недель
- в) непосредственно перед родоразрешением
- г) не осматривается никогда
- д) во 2 триместре беременности

58. Больничный лист работающей беременной с ОРВИ выдается сроком на: (выберите один правильный ответ)

- а) весь период высокой температуры
- б) на 5-7 дней с возможной пролонгацией
- в) не выдается
- г) на 10-14 дней
- д) на 21 день

59. Направление на стационарное лечение выдается беременной при наличии: (выберите один правильный ответ)

- а) железодефицитной анемии легкой степени
- б) бессимптомной бактериурии
- в) артериальной гипертензии
- г) артериальной гипотензии
- д) запоров

60. Показания для госпитализации больных гриппом: 1) легкие и среднетяжелые формы болезни; 2) тяжелые формы болезни; 3) наличие осложнений; 4) наличие тяжелых сопутствующих заболеваний; 5) молодые лица до 30 лет. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 2, 3, 4
- в) 3, 4, 5
- г) 1, 2, 3
- д) 4, 5

61. Наиболее частые осложнения при гриппе: 1) менингит; 2) миокардит; 3) пневмония; 4) панкреатит; 5) синусит. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 2, 3, 4
- в) 3, 4, 5
- г) 1, 2, 3
- д) 3, 5

62. Кратность проведения диспансерных осмотров при хроническом бронхите в течение года: (выберите один правильный ответ)

- а) 1 раз

- б) 2 раза
- в) 3 раза
- г) 4 раза
- д) 5 раз

63. Осложнения хронического бронхита: (выберите один правильный ответ)

- а) лёгочное кровотечение
- б) острая сосудистая недостаточность
- в) острая сердечная недостаточность
- г) хроническая дыхательная недостаточность
- д) хроническая почечная недостаточность

64. Меры специфической профилактики гриппа: (выберите один правильный ответ)

- а) изоляция больных
- б) введение противогриппозной вакцины
- в) ношение четырехслойной маски
- г) кварцевание помещений
- д) изоляция здоровых

65. Неспецифическая профилактика гриппа включает использование: (выберите один правильный ответ)

- а) иммунобиологических препаратов
- б) противовирусных препаратов
- в) антибактериальных препаратов в профилактических целях
- г) все ответы правильные
- д) а, б

66. В «золотой стандарт» диагностики пневмонии входят: 1) острое начало; 2) инфильтрация в легочной ткани, которая ранее не определялась на рентгенограмме; 3) инспираторное удушье; 4) кашель с мокротой; 5) абсолютный лимфоцитоз; 6) лихорадка. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 5
- в) 2, 4, 6
- г) 1, 2, 3
- д) 4, 5

67. Настороженность следует проявлять при пневмонии у пациентов: 1) с отягощенным анамнезом; 2) с наличием инфильтрата в легких; 3) с неэффективностью терапии; 4) с затяжным течением. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 4
- в) 3, 4
- г) 1, 2, 3
- д) 4

68. Осложнение пневмоний: (выберите один правильный ответ)

- а) абсцесс легких
- б) плеврит
- в) миокардит
- г) перикардит
- д) инфекционно-токсический шок
- е) возможны все перечисленные варианты

69. Какой антибиотик является средством выбора при лечении коммунальной (внебольничной) пневмонии, по клиническим и бактериологическим исследованиям определяемой как пневмококковая: (выберите один правильный ответ)

- а) доксициклин
- б) ампициллин
- в) цефалоспорины III поколения
- г) пенициллин
- д) эритромицин
- е) гентамицин

70. Наиболее эффективная комбинация антибиотиков при эмпирической антибактериальной терапии крайне тяжелой пневмонии: (выберите один правильный ответ)

- а) пенициллин + оксациллин
- б) ампициллин + оксациллин
- в) ампициллин + гентамицин
- г) амоксициллин + клавуланат + цефалоспорины + левофлоксацин
- д) тетрациклин + эритромицин
- е) ампициллин + оксациллин + стрептомицин

71. Больного с пневмонией следует госпитализировать, если: (выберите один правильный ответ)

- а) больной старше 70 лет
- б) нет эффекта от проводимой антибактериальной терапии
- в) одышка свыше 30 в минуту
- г) уровень Hb ниже 90 г/л
- д) все вышеперечисленное

72. Женщинам в случае нормально протекающей беременности, родов, послеродового периода и рождения живого ребенка листок нетрудоспособности выдается на срок: (выберите один правильный ответ)

- а) 86 дней
- б) 140 дней
- в) 156 дней
- г) 180 дней
- д) 194 дня

73. В исключительных случаях право на выписку рецептов имеют: 1) санитарки; 2) зубные врачи; 3) фельдшеры, акушерки; 4) студенты медицинских вузов; 5) ветеринарные врачи. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 4
- в) 3, 4
- г) 2, 3
- д) 4

74. Препаратом выбора при лечении гестационного пиелонефрита является: (выберите один правильный ответ)

- а) эритромицин
- б) ципрофлоксацин
- в) цефтриаксон
- г) амоксициллин плюс клавулановая кислота
- д) канефрон

75. «Аспириновая» астматическая триада включает: (выберите один правильный ответ)

- а) хронический гайморит, поллиноз, язвенный колит
- б) бронхиальную астму, непереносимость нестероидных противовоспалительных препаратов, полипоз носа
- в) аллергию на лекарственные препараты, ларингит, лихорадку
- г) гипотензию, анемию, тахикардию

д) хронический бронхит, альвеолит, плеврит

76. Для купирования гипертонического криза у беременных применяют: (выберите один правильный ответ)

- а) каптоприл
- б) дибазол с папаверином внутримышечно
- в) раствор сульфата магния парентерально или клонидин
- г) раствор сульфата магния энтерально или лозартан
- д) пентамин парентерально

77. Лабораторные методы исследования, применяемые для диагностики ХСН: 1) электролиты крови; 2) креатинин, мочевины крови; 3) коагулограмма; 4) бактериологическое исследование мочи; 5) прогестерон крови. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 4
- в) 3, 4
- г) 1, 2, 3
- д) 4

78. Каковы основные причины роста смертности от бронхиальной астмы: (выберите один правильный ответ)

- а) социально-экономические условия
- б) ухудшение экологической обстановки (загрязнение окружающей среды)
- в) старение населения земного шара
- г) гиподиагностика и неправильное лечение бронхиальной астмы
- д) все вышеперечисленное

79. Признаком декомпенсации ХСН является: (выберите один правильный ответ)

- а) гепатомегалия
- б) кардиомегалия
- в) гидроторакс
- г) острый отек легких
- д) отеки нижних конечностей

80. К методам профилактики при наличии бронхиальной астмы можно отнести: (выберите один правильный ответ)

- а) прекращение контакта с аллергеном
- б) наблюдение аллерголога
- в) своевременная и адекватная терапия
- г) своевременное проведение вакцинации от гриппа
- д) все перечисленные варианты

81. У пожилых и стариков наблюдается, связанная с инволюцией:(выберите один правильный ответ)

- а) гипотермия
- б) гиперволемия
- в) высокая социальная активность
- г) лихорадка
- д) изолированная систолическая артериальная гипертензия

82. По результатам диспансеризации формируется

- а) 3 группы
- б) 1 группа
- в) 2 группы
- г) 4 группы

83. Диспансерное наблюдение пациентов без доказанных сердечно-сосудистых заболеваний с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском осуществляет (выберите один правильный ответ)

- А) врач отделения медицинской профилактики, при отсутствии кабинета профилактики, например, в сельской местности – врач-терапевт участковый
- Б) врач-терапевт участковый
- В) врач дневного стационара
- Г) врач-кардиолог поликлиники

84. Количество дней временной нетрудоспособности при дискинезиях желчевыводящих путей: (выберите один правильный ответ)

- а) до 10-15 дней при выраженном обострении
- б) до появления стойкой ремиссии
- в) временная нетрудоспособность не устанавливается

85. Краткое профилактическое консультирование занимает ___ минут (выберите один правильный ответ)

- А) 10
- Б) 30
- В) 60
- Г) 5

86. Инвалидность I группы устанавливается на (выберите один правильный ответ)

- А) 2 года
- Б) 1 год
- В) 3 года
- Г) бессрочно

87. Вероятной причиной анемии у мужчины 55 лет перенесшего 7 лет назад резекцию желудка (в мазке крови макроцитоз) является дефицит (выберите один правильный ответ)

- А) цианкобаламина
- Б) железа
- В) эритропоэтина
- Г) пиридоксина

88. Основной целью антихеликобактерной терапии при язвенной болезни является (выберите один правильный ответ)

- А) снижение частоты рецидивов
- Б) уменьшение выраженности болевого синдрома
- В) ускорение рубцевания язвы
- Г) уменьшение риска прободения язвы

89. Санаторно-курортное лечение показано больным хроническим некалькулезным холециститом спустя: (выберите один правильный ответ)

- а) 1 месяц после обострения болезни
- б) 2 месяца после обострения болезни
- в) 3 месяца после обострения болезни
- г) 6 месяцев после обострения болезни

90. Временная нетрудоспособность при обострении хронического холецистита определяется при: 1) повышении активности щелочной фосфатазы; 2) наличии субфебрилитета; 3) повышении активности сорбитдегидрогеназы; 4) наличии диспепсии; 5) нарушении функций организма, обусловленных клинической картиной обострения холецистита; 6) анемии; 7) появлении субиктеричности. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2, 6, 7

- б) 1, 3, 5
- в) 3, 4, 5
- г) 1, 2, 4, 5
- д) 4, 5

91. Показания к санаторно-курортной реабилитации при заболеваниях кишечника: (выберите один правильный ответ)

- а) становление ремиссии
- б) смена времени года;
- в) обострение заболевания

92. При болезни Вильсона-Коновалова поражаются (выберите один правильный ответ)

- А) печень и мозг
- Б) сердце и почки
- В) почки и легкие
- Г) печень и почки

93. В диагностике цирроза печени решающим является (выберите один правильный ответ)

- А) эластометрия
- Б) ультразвуковое исследование
- В) рентгенография
- Г) ирригоскопия

94. При тяжелом хроническом энтероколите диспансерные осмотры проводятся: (выберите один правильный ответ)

- а) 2 раза в год
- б) 3 раза в год
- в) 4 раза в год
- г) 6 – 8 раз в год
- д) ежемесячно

95. На наличие холестаза указывают (выберите один правильный ответ)

- А) повышение щелочной фосфатазы, билирубина, холестерина
- Б) повышение аспарагиновой и аланиновой трансаминаз, глюкозы
- В) снижение протромбина, гемоглобина, фибриногена
- Г) увеличение амилазы, общего белка, креатинина

96. К клиническим признакам острого гломерулонефрита относят следующие синдромы:

- а) мочевого, отечный, гипертензионный
- б) мочевого, почечной недостаточности, асцитический
- в) гипертензионный, кардиалгический, отечно-асцитический
- г) отечный, цитолитический, анемический
- д) отечный, гипертензионный, почечной колики

97. Уровнем триглицеридов, являющимся фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, является _____ ммоль/л (выберите один правильный ответ)

- А) 1,7
- Б) 1,2
- В) 1,0
- Г) 0,7

98. К ассоциированному клиническому состоянию при артериальной гипертензии относится (выберите один правильный ответ)

- А) расслаивающая аневризма аорты

- Б) аортальный стеноз
- В) аортальная недостаточность
- Г) трикуспидальная недостаточность

99. Дополнительным методом обследования больных артериальной гипертензией, устанавливающим наличие и тяжесть поражения органов-мишеней, является (выберите один правильный ответ)

- А) оценка состояния глазного дна
- Б) суточная экскреция с мочой кортизола
- В) содержание альдостерона в крови
- Г) суточная экскреция адреналина

100. Больные артериальной гипертензией с высоким и очень высоким риском считаются при наличии _____ синдрома (выберите один правильный ответ)

- А) метаболического
- Б) астено-вегетативного
- В) диспептического
- Г) постхолецистэктомического

101. Причиной артериальной гипертензии при поражении паренхимы почек является (выберите один правильный ответ)

- А) активация ренин-ангиотензиновой системы
- Б) избыточная секреция минералокортикоидов
- В) повышенная секреция катехоламинов
- Г) повышенное образование ангиотензина

102. При обращении к врачу-терапевту участковому в пункте 19 учетной формы N 025-1/У «Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» необходимо выбрать пункт (выберите один правильный ответ)

- А) первичная врачебная медико-санитарная помощь
- Б) первичная доврачебная медико-санитарная помощь
- В) первичная специализированная медико-санитарная помощь
- Г) паллиативная медицинская помощь

103. Учетная форма N 030-13/У «Паспорт врачебного участка граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг» по завершении отчетного периода подписывается (выберите один правильный ответ)

- А) врачом-терапевтом участковым и специалистом организационно-методического кабинета
- Б) главным врачом
- В) председателем врачебной комиссии
- Г) заместителем главного врача по организационно-методической работе

104. «Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение» (Форма N 070/У), выдаваемая лицу, имеющего право на получение социальных услуг, заверяется подписью: (выберите один правильный ответ)

- А) председателя врачебной комиссии
- Б) лечащего врача
- В) главного врача
- Г) заместителя главного врача по организационно-методической работе

105. «Направление на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию» (учетная форма N 057/У-04) подписывается

- А) заведующим отделением
- Б) главным врачом
- В) заместителем главного врача по лечебной работе
- Г) председателем врачебной комиссии

106. Разрешение на продление листка нетрудоспособности более 15 дней определяется

- А) врачебной комиссией
- Б) лечащим врачом
- В) главным врачом
- Г) заместителем главного врача по клинико-экспертной работе

107. В случаях травм, реконструктивных операций и лечении туберкулеза при очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе граждане направляются на медико-социальную экспертизу не позднее _____ месяцев

- А) 12-ти
- Б) 4-х
- В) 10-ти
- Г) 3-х

108. Диспансерное наблюдение пожилых людей при наличии анемии необходимо проводить: (выберите один правильный ответ)

- а) 1 раз в месяц
- б) 1 раз в 2 – 3 месяца
- в) 1 раз в полгода
- г) 1 – 2 раза в год
- д) 3 раза в год

109. Выбор тактики при паллиативной помощи зависит от

- А) стадии опухолевого процесса и жизненного прогноза
- Б) стадии опухолевого процесса
- В) возраста пациента
- Г) локализации опухоли

110. Депрессия сегмента ST на ЭКГ типична для

- А) приступа стенокардии напряжения
- Б) приступа вариантной (вазоспастической) стенокардии
- В) перикардита
- Г) аневризмы левого желудочка

111. Наиболее частой причиной развития острого миокардита являются

- А) вирусные инфекции
- Б) бактериальные инфекции
- В) грибковые инфекции
- Г) воздействия токсинов

112. Самой частой причиной коронарной недостаточности является

- А) атеросклероз коронарных артерий
- Б) «мышечный» мостик
- В) коронариит
- Г) гипертрофия левого желудочка

113. Синкопальные состояния, головокружение, коронарная недостаточность и одышка чаще всего встречаются при

- А) ГКМП с обструкцией выносящего тракта ЛЖ
- Б) недостаточности аортального клапана
- В) ДКМП
- Г) постинфарктном кардиосклерозе

114. В таблице SCORE для оценки сердечно-сосудистого риска отсутствует показатель

- А) глюкозы крови

- Б) общего холестерина
- В) систолического АД
- Г) возраста

115. Кардиоспецифическим маркером некроза миокарда является

- А) тропонин I
- Б) миоглобин
- В) ЛДГ
- Г) общая КФК

116. Прием сердечных гликозидов у больных ХСН противопоказан при

- А) а-в блокаде II ст.
- Б) а-в блокаде I ст.
- В) фибрилляции предсердий
- Г) синусовой тахикардии

117. Прием статинов следует отменить при повышении активности трансаминаз в крови выше нормы в

- А) 3 раза
- Б) 2 раза
- В) 4 раза
- Г) 5 раз

118. Наличие триады симптомов - стойкое повышение желудочной секреции, изъязвление ЖКТ, диарея - указывает на

- А) синдром Золлингера-Эллисона
- Б) язвенную болезнь с локализацией в желудке
- В) язвенный колит
- Г) хронический панкреатит

119. Наиболее часто встречающимся симптомом при диффузном эзофагоспазме является

- А) боль за грудиной
- Б) одинофагия
- В) дисфагия
- Г) регургитация

120. Диагноз сахарного диабета устанавливается при уровне гликированного гемоглобина _____%

- А) $\geq 6,5$
- Б) $\geq 6,0$
- В) $\geq 6,8$
- Г) $\geq 7,0$

121. Уровень инсулина в сыворотке крови чаще бывает повышен

- А) при сахарном диабете 2 типа
- Б) при сахарном диабете 1 типа
- В) после стимуляции глюкозой при сахарном диабете 1 типа
- Г) после стимуляции глюкозой при сахарном диабете 2 типа

122. Риск развития сахарного диабета 2 типа повышен у

- А) женщин, родивших ребенка массой более 4,5 кг.
- Б) людей, часто болеющих вирусными инфекциями
- В) людей, в возрасте до 1 года, получавших коровье молоко
- Г) женщин, родивших ребенка массой менее 2,5 кг.

123. «Золотым стандартом» диагностики и оценки холл является

- А) спирометрия
- Б) бронхоскопия
- В) компьютерная томография
- Г) пикфлоуметрия

124. Для крупозной пневмонии в разгар болезни характерным перкуторным звуком является

- А) тупой
- Б) коробочный
- В) тимпанический
- Г) металлический

125. По данным ВОЗ, людьми пожилого возраста считаются лица старше: (выберите один правильный ответ)

- а) 40 лет
- б) 50 лет
- в) 60 лет
- г) 80 лет
- д) 90 лет

126. У больных пожилого и старческого возраста наиболее часто встречаются: (выберите один правильный ответ)

- а) болезни дыхательной системы
- б) болезни эндокринной системы
- в) болезни сердечно-сосудистой системы
- г) болезни костно-мышечной системы
- д) болезни кроветворной системы

127. По классификации ВОЗ, к «старым» относятся: (выберите один правильный ответ)

- а) люди 60-74 лет
- б) люди 75-89 лет
- в) люди старше 90 лет

128. Витаукт – это: (выберите один правильный ответ)

- а) механизм апоптоза
- б) механизмы старения
- в) механизмы активного противодействия процессам старения
- г) омолаживающая процедура
- д) механизм мутации

129. Современная геронтология изучает: (выберите один правильный ответ)

- а) механизмы заболеваемости у взрослого населения
- б) причины смерти в различных возрастных группах
- в) механизмы противодействию старения
- г) механизмы и причины старения от молекулярного и клеточного уровней до целостного организма
- д) онкологические болезни пожилых

130. Синдром малых раковых признаков: 1) ухудшение или изменение аппетита; 2) немотивированное похудание; 3) изменение голоса; 4) изменение характера кашля; 5) изменение настроения. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 5
- в) 3, 4, 5
- г) 1, 2, 3, 4
- д) 4, 5

131. Появление ортопноэ является признаком: (выберите один правильный ответ)

- а) инфаркта миокарда;
- б) инсульта;
- в) приступа стенокардии;
- г) недостаточности кровообращения I степени;
- д) недостаточности кровообращения II степени.

132. Кратность наблюдения больных дилатационной кардиомиопатией участковым врачом составляет: (выберите один правильный ответ)

- а) 4 раза в год
- б) 3 раза в год
- в) 2 раза в год
- г) 1 раз в год
- д) 6 раз в год

133. КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) нормализация температуры через 48-72 часа
- Б) полное рассасывание инфильтрата в легочной ткани
- В) нормализация всех лабораторных показателей
- Г) нормализация температуры в утренние и дневные часы

134. Какие патологические состояния требуют исключения при длительной неустоановленной гипертермии: (выберите один правильный ответ)

- а) туберкулез
- б) заболевания соединительной ткани
- в) острый тиреоидит
- г) пневмония
- д) лихорадка лекарственного происхождения
- е) все вышеперечисленное
- ж) варианты а, в, г

135. В обязательный минимум лабораторных исследований длительно лихорадящих больных входят: (выберите один правильный ответ)

- а) общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы
- б) определение в мазке малярийных плазмодиев
- в) тесты функционального состояния печени
- г) бактериологические посеы мочи, кала и крови до 3-6 раз
- д) все вышеперечисленное
- е) ничего из указанного

136. К критериям, позволяющим диагностировать лихорадку неясного генеза, относятся: (выберите один правильный ответ)

- а) наличие у больного температуры 38° С и выше
- б) длительность лихорадки 3 недели и более
- в) неясность диагноза после проведения обследования с помощью общепринятых (рутинных) методов
- г) все вышеперечисленные варианты
- д) только варианты а и б

137. Группы лекарственных средств, при применении которых возможно повышение температуры: (выберите один правильный ответ)

- а) нейролептики;
- б) трициклические антидепрессанты;
- в) антидепрессанты из группы ингибиторов МАО;
- г) антибактериальные препараты;
- д) только варианты а и г;

е) все перечисленные варианты.

138. Критериями артериальной гипертензии являются: (выберите один правильный ответ)

- а) уровень систолического давления 140 мм.рт.ст. и выше или диастолического давления 90 мм.рт.ст. и более
- б) повышение систолического давления выше 120 мм.рт.ст. или диастолического давления больше 80 мм.рт.ст.
- в) повышение систолического давления выше 160 мм.рт.ст. или диастолического давления больше 95 мм.рт.ст

139. Клиническая ситуация при лечении АГ, не предполагающая применение β-адреноблокаторов: (выберите один правильный ответ)

- а) стенокардия после перенесенного ИМ
- б) ХСН
- в) беременность
- г) тахикардия
- д) хроническая почечная недостаточность

140. Назначение какого β-адреноблокатора возможно при лечении АГ у пациента с хроническим обструктивным бронхитом: (выберите один правильный ответ)

- а) атенолол
- б) надолол
- в) пиндолол
- г) пропранолол
- д) окспренолол

141. Для купирования неосложненных гипертонических кризов применяют: (выберите один правильный ответ)

- а) нитроглицерин
- б) каптоприл
- в) кардикет
- г) кордарон

142. Наиболее частым побочным эффектом ингаляционных глюкокортикостероидов является

- А) дисфония
- Б) остеопороз
- В) гипергликемия
- Г) ожирение

143. При ХОБЛ обязательной является вакцинация _____ вакциной

- А) противогриппозной
- Б) противокклюшной
- В) противоменингококковой
- Г) противодифтерийной

144. При назначении ингаляционных глюкокортикостероидов врач должен предупредить пациента о возможном развитии неблагоприятной лекарственной реакции в виде

- А) кандидоза полости рта
- Б) системного остеопороза
- В) синдрома Кушинга
- Г) стероидного сахарного диабета

145. ЛСД (диэтиламид D-лизергиновой кислоты) относят к

- А) галлюциногенам
- Б) психостимуляторам
- В) производным конопли

Г) опиатам

146. Постоянные, колющие, стреляющие боли в области сердца, усиливающиеся при вдохе, характерны для: (выберите один правильный ответ)

- а) стенокардии
- б) гидроперикарда
- в) сухого перикардита
- г) аневризмы левого желудочка
- д) митрального стеноза

147. Тактика участкового врача при впервые возникшей стенокардии: (выберите один правильный ответ)

- а) снятие ЭКГ, купирование болевого синдрома и амбулаторное лечение
- б) снятие ЭКГ, купирование болевого синдрома, аспирин 0,325, плавикс 100 мг и госпитализация
- в) выдача направления на плановую госпитализацию
- г) амбулаторное обследование

148. Тактика участкового терапевта при подозрении на острый инфаркт миокарда: (выберите один правильный ответ)

- а) снять ЭКГ на месте, купировать болевой синдром, аспирин и тромболитики, срочная госпитализация по скорой помощи
- б) ввести спазмолитики и проводить наблюдение
- в) направить больного самостоятельно в стационар на госпитализацию
- г) проводить амбулаторное лечение, а при неэффективности направить в стационар на госпитализацию

149. Наиболее типичным клиническим признаком фиброзирующего альвеолита служит: (выберите один правильный ответ)

- а) кашель
- б) боли в грудной клетке
- в) одышка
- г) кровохарканье
- д) повышение температуры

150. Признаками тромбоэмболии легочной артерии на ЭКГ является: (выберите один правильный ответ)

- а) резкая перегрузка левого предсердия
- б) острая блокада правой ножки пучка Гиса
- в) глубокие зубцы SI, QIII
- г) резко отрицательный TIII

151. Для опоясывающего лишая (Herpes zoster) характерно: (выберите один правильный ответ)

- а) интенсивные жгучие боли, возникающие по ходу чувствительного нерва; типичные герпетические высыпания – сгруппированные везикулы, наполненные серозным содержимым
- б) приступообразные колющие боли, возникающие по ходу чувствительного нерва; типичные герпетические высыпания – сгруппированные везикулы, наполненные серозным содержимым

152. Для болевого синдрома при диффузном эзофагоспазме характерно: (выберите один правильный ответ)

- а) рецидивирование болей, боль обусловлена спастическими сокращениями гладкой мускулатуры, возникает спонтанно, как в покое (вне приема пищи), так и при проглатывании пищи или слюны, боль усиливается на фоне эмоционального стресса
- б) рецидивирование болей, боль обусловлена спастическими сокращениями гладкой мускулатуры, возникает при проглатывании пищи или слюны, боль усиливается на фоне эмоционального стресса

153. Чаще всего причиной ОИМ является: (выберите один правильный ответ)

- а) коронарораспизм
- б) коронаросклероз
- в) воспаление коронарных сосудов
- г) гипертоническая болезнь

154. При ОИМ противопоказаны: (выберите один правильный ответ)

- а) ненаркотические анальгетики
- б) нейролептики
- в) сердечные гликозиды
- г) нитраты

155. Какие признаки достоверно отличают болевой синдром у больного с развивающимся инфарктом миокарда от ангинозных болей у пациента со стенокардией: 1) локализация болей; 2) характер болей (давящие, жгучие и др.); 3) иррадиация; 4) продолжительность болей; 5) отношение болей к физ. нагрузке; 6) отношение болей к приему нитроглицерина; 7) отношение болей к приему валидола. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2, 6
- б) 1, 3, 5
- в) 3, 4, 5, 7
- г) 1, 2, 3
- д) 4, 6

156. Для подтверждения мелкоочагового ИМ необходимо: (выберите один правильный ответ)

- а) снять ЭКГ
- б) произвести биохимический анализ крови и ОАК, помимо ЭКГ
- в) произвести велоэргометрию
- г) произвести пробу с фармакологическими препаратами

157. Из перечисленных состояний противопоказаниями для направления больных, перенесших инфаркт миокарда, на санаторное лечение являются: (выберите один правильный ответ)

- а) единичная экстрасистолия
- б) АВ-блокада I степени
- в) недостаточность кровообращения III стадии
- г) все перечисленное
- д) ни одно из перечисленных

158. Из перечисленных состояний не являются противопоказаниями к санаторному лечению больных, перенесших инфаркт миокарда: (выберите один правильный ответ)

- а) пароксизмальная желудочковая тахикардия
- б) компенсированный сахарный диабет
- в) тромбоэмболические осложнения в остром периоде
- г) ранняя постинфарктная стенокардия
- д) все вышеперечисленные

159. При каких заболеваниях может развиваться миокардит: 1) СКВ; 2) подострый септический эндокардит; 3) сывороточная болезнь; 4) ревматоидный полиартрит. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3
- в) 1, 2, 3
- г) 1, 2, 3, 4
- д) 4

160. Какие аускультативные симптомы можно обнаружить у больного миокардитом: 1) приглушение тонов сердца; 2) ритм галопа; 3) систолический шум на верхушке сердца; 4) хлопающий I тон на верхушке сердца. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2, 4
- б) 1, 3, 4
- в) 3, 4
- г) 1, 2, 3
- д) 4

161. К основным предикторам внезапной смерти при гипертрофической кардиомиопатии не относится: (выберите один правильный ответ)

- а) молодой возраст
- б) случаи внезапной смерти у ближайших родственников
- в) наличие у больного пароксизмов желудочковой тахикардии (в том числе короткие «пробежки» ЖТ)
- г) наличие изолированной систолической гипертензии

162. Какие изменения лабораторных показателей отражают активность воспалительного процесса в миокарде: 1) гиперурикемия; 2) гиперфибриногенемия; 3) гиперхолестеринемия; 4) повышение СРБ в плазме крови. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3
- в) 3, 4
- г) 1, 2, 3
- д) 2, 4

163. Выберите основные принципы лечения миокардита: 1) ограничение физической нагрузки; 2) этиотропная терапия; 3) купирование воспаления; 4) цитопротекция. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3
- в) 3, 4
- г) 1, 2, 3, 4
- д) 4

164. По каким критериям оценивается тяжесть течения миокардита: 1) по размерам полостей сердца; 2) наличию или отсутствию перикардита; 3) выраженности клинических проявлений сердечной недостаточности; 4) величине СОЭ. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3
- в) 3, 4
- г) 1, 2, 3, 4
- д) 2, 4

165. Сердечные гликозиды нельзя сочетать с: (выберите один правильный ответ)

- а) верошпироном
- б) препаратами калия
- в) лидокаином
- г) β -блокаторами

166. Противопоказанием для применения анаприлина является: 1) острый инфаркт миокарда; 2) язвенная болезнь желудка; 3) бронхиальная астма; 4) выраженная застойная сердечная недостаточность. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3
- в) 2, 3, 4

- г) 1, 2, 3, 4
- д) 2, 4

167. Препаратами выбора при ХСН являются: 1) β - блокаторы; 2) ингибиторы АПФ; 3) нитраты; 4) мочегонные препараты; 5) сердечные гликозиды. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2, 5
- б) 1, 3, 5
- в) 3, 4
- г) 2, 3, 4
- д) 1, 2, 3, 4, 5

168. Укажите показания для назначения β -блокаторов при сердечной недостаточности: 1) легкая сердечная недостаточность; 2) тяжелая сердечная недостаточность; 3) стойкая синусовая тахикардия после ликвидации отечного синдрома; 4) сопутствующая стенокардия напряжения; 5) частая желудочковая экстрасистолия. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3
- в) 3, 4, 5
- г) 1, 2, 3, 4
- д) 2, 4

169. Санаторно-курортное лечение при ХСН показано при: (выберите один правильный ответ)

- а) отеке легких
- б) ХСН ФК I и II
- в) ХСН ФК IV
- г) наличии отеков
- д) ХСН на фоне гипертонической болезни 3 стадии, 3 степени

170. Больной ХСН может быть признан временно нетрудоспособным на 10-14 дней при: (выберите один правильный ответ)

- а) ХСН ФК III
- б) ХСН ФК IV
- в) острой левожелудочковой недостаточности
- г) ХСН ФК I и II в начале заболевания
- д) если нуждается в постоянном уходе

171. Бессрочно 1 группа инвалидности устанавливается у больного с: (выберите один правильный ответ)

- а) ХСН ФК I и II
- б) ХСН ФК IV, не нуждающегося в постоянном уходе
- в) ХСН ФК IV, нуждающегося в постоянном уходе
- г) ХСН с отеком легких
- д) ХСН и периферическими отеками

172. Диспансеризация больных с ХСН включает: (выберите один правильный ответ)

- а) ежегодный осмотр участковым терапевтом
- б) осмотр терапевтом 2 раза в год
- в) осмотр терапевтом «по требованию»
- г) осмотр терапевтом 1 раз в 3 месяца

173. Показания к госпитализации у больного с ХСН: 1) прогрессирующая ХСН; 2) пневмония у больного ХСН; 3) отек легких у больного с ХСН; 4) назначение диуретической терапии; 5) подбор дозы ингибитора АПФ для постоянной терапии. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2, 3
- б) 1, 3, 5
- в) 3, 4
- г) 1, 2, 3, 4
- д) 2, 4, 5

174. Профилактика ХСН включает: 1) контроль употребления соли и воды; 2) отказ от алкоголя; 3) адекватные физические нагрузки; 4) режим лекарственной терапии; 5) применение варфарина. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2, 4
- б) 1, 3
- в) 3, 4, 5
- г) 1, 2, 3, 4
- д) 2, 4, 5

175. Для язвенной болезни желудка характерно: (выберите один правильный ответ)

- а) развитие в старшей возрастной группе среднего возрастного периода (55-65 лет)
- б) наследственная предрасположенность к развитию заболевания
- в) отсутствие обратной диффузии водородных ионов в слизистой желудка
- г) преобладание больных с возбудимым типом желудочной секреции
- д) резкое нарушение ощелачивающей функции антрального отдела

176. У пациентов с язвенной болезнью желудка чаще встречается: (выберите один правильный ответ)

- а) изжога
- б) боль в околопупочной области
- в) диарея
- г) запор
- д) боль в эпигастрии через 1,5-2 часа после приема пищи

177. Для язвенной болезни двенадцатиперстной кишки характерно все, кроме: (выберите один правильный ответ)

- а) повышенной моторной функции желудка
- б) высокой продукции пепсина
- в) гиперплазии фундальных желез
- г) сниженной кислотно-нейтрализующей функции антрального отдела
- д) преобладания гормональной природы кислотообразования

178. В какой срок после перенесенной инфекции развивается острый гломерулонефрит: (выберите один правильный ответ)

- а) 10-12 дней
- б) 3-4 дня
- в) неделя
- г) месяц
- д) 2 месяца

179. Какая возрастная группа наиболее подвержена заболеванию острым гломерулонефритом: (выберите один правильный ответ)

- а) до 2 лет
- б) с 2-летнего возраста до 40 лет
- в) климактерический период
- г) период менопаузы
- д) пубертатный период

180. Какие диетические мероприятия показаны при остром гломерулонефрите: (выберите один правильный ответ)

- а) ограничение хлорида натрия до 1,5 г/сутки

- б) увеличение потребления хлорида натрия
- в) увеличение количества потребляемой жидкости
- г) повышение потребления K⁺-содержащих продуктов

181. Самым частым клиническим вариантом хронического гломерулонефрита является: (выберите один правильный ответ)

- а) гематурический
- б) латентный
- в) нефротический
- г) гипертонический
- д) смешанный

182. Для хронического гломерулонефрита характерна: (выберите один правильный ответ)

- а) гломерулярная протеинурия
- б) тубулярная протеинурия
- в) протеинурия переполнения
- г) протеинурия напряжения

183. Вариант хронического гломерулонефрита, который может не сопровождаться обязательным развитием хронической почечной недостаточности: (выберите один правильный ответ)

- а) латентный
- б) гематурический
- в) гипертонический
- г) нефротический
- д) смешанный

184. Главным признаком нефротического синдрома является: (выберите один правильный ответ)

- а) лейкоцитурия
- б) протеинурия
- в) гематурия
- г) цилиндрурия
- д) бактериурия

185. Для нефротического синдрома характерны осложнения: (выберите один правильный ответ)

- а) инфекции
- б) тромбозы
- в) нефротический криз
- г) ОПН
- д) ДВС-синдром
- е) все перечисленные

186. В норме реакция мочи чаще всего: (выберите один правильный ответ)

- а) слабощелочная
- б) слабокислая
- в) стойкая щелочная
- г) стойкая кислая

187. Моча становится мутной при большом содержании в ней: (выберите один правильный ответ)

- а) эритроцитов
- б) цилиндров
- в) лейкоцитов
- г) белка

- 188. Моча не окрашивается в красноватый цвет от присутствия: (выберите один правильный ответ)**
- а) эритроцитов
 - б) гемоглобина
 - в) уробилиногена
 - г) миоглобина
- 189. Ангиография сосудов почек применяется для выявления: (выберите один правильный ответ)**
- а) мочекаменной болезни
 - б) поражения почечных сосудов
 - в) миеломной болезни
 - г) хронического пиелонефрита
- 190. Препарат выбора при пиелонефрите беременных в сроке до 12 недель: (выберите один правильный ответ)**
- а) бисептол
 - б) амоксиклав
 - в) ципрофлоксацин
 - г) тетрациклин
- 191. Минимум инструментального обследования, необходимый больному с клиникой острого пиелонефрита: (выберите один правильный ответ)**
- а) хромоцистография
 - б) ретроградная пиелография
 - в) УЗИ почек, обзорная R-графия мочевых путей
 - г) цистоскопия, 3-стаканная проба
- 192. Изменение биохимических показателей при хронической почечной недостаточности: (выберите один правильный ответ)**
- а) гиперальбуминемия
 - б) дислипидемия
 - в) гиперкреатининемия
 - г) уробилинурия
 - д) гипербилирубинемия
- 193. Уровень клубочковой фильтрации, характерный для терминальной стадии хронической почечной недостаточности: (выберите один правильный ответ)**
- а) 40 мл/мин
 - б) 30 мл/мин
 - в) 20 мл/мин
 - г) 15 мл/мин
 - д) 5 мл/мин
- 194. Группа антибиотиков, не показанных при остром гломерулонефрите: (выберите один правильный ответ)**
- а) пенициллины
 - б) цефалоспорины
 - в) аминогликозиды
 - г) макролиды
 - д) тетрациклин
- 195. Самым достоверным признаком ХПН является: (выберите один правильный ответ)**
- а) артериальная гипертензия
 - б) гиперкалиемия
 - в) повышение уровня креатинина крови
 - г) олигурия

д) протеинурия

196. Перечислите основные синдромы ХПН: (выберите один правильный ответ)

- а) нефротический
- б) гастроэнтерологический
- в) анемически-геморрагический
- г) серозно-суставной
- д) костный
- е) дистрофический
- ж) все перечисленные синдромы

197. Ведущими факторами риска возникновения и неблагоприятного течения онкологических заболеваний являются: 1) злоупотребление алкоголем; 2) избыточная масса тела; 3) низкая физическая активность; 4) пассивное курение; 5) активное курение. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 4, 5
- в) 3, 4
- г) 1, 2, 3, 4
- д) 2, 4

198. Предопухолевым заболеванием считается: (выберите один правильный ответ)

- а) пневмония
- б) хронический тонзиллит
- в) остеохондроз позвоночника
- г) язвенная болезнь желудка
- д) дискинезия желчевыводящих путей

199. Наиболее частые осложнения ХСН: 1) тромбоз глубоких вен нижних конечностей; 2) нарушения ритма и проводимости; 3) ОРВИ; 4) гипертонические кризы; 5) легочные кровотечения. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 4, 5
- в) 3, 4, 5
- г) 2, 3, 4
- д) 2, 4

200. Предраковыми заболеваниями при диагностике злокачественных опухолей являются: 1) ревматизм; 2) диффузный семейный полипоз; 3) лейкоплакия пищевода; 4) множественные полипы желудка; 5) бронхиальная астма. Выберите правильную комбинацию ответов:

- а) 1, 2, 3
- б) 1, 3, 4, 5
- в) 3, 4, 5
- г) 2, 3, 4
- д) 2, 4

201. К методам и средствам первичной профилактики следует отнести: (выберите один правильный ответ)

- а) раннюю диагностику заболеваний
- б) хирургическую коррекцию болезней, закаливание
- в) профилактическую госпитализацию
- г) оздоровление окружающей среды, вакцинирование

202. Целью вторичной профилактики является предупреждение возникновения: (выберите один правильный ответ)

- а) острых заболеваний
- б) осложнений заболеваний, хронических заболеваний
- в) несчастных случаев
- г) злокачественных новообразований

203. Максимальный срок единоличной выдачи листка нетрудоспособности при заболеваниях и травмах составляет: (выберите один правильный ответ)

- а) 3 дня нетрудоспособности
- б) 5 дней нетрудоспособности
- в) 6 дней нетрудоспособности
- г) 10 дней нетрудоспособности
- д) 15 дней нетрудоспособности

204. Задачи диспансеризации: а) своевременное направление на санаторно-курортное лечение здоровых лиц; б) выявление лиц с факторами риска и больных на ранних стадиях заболеваний путем проведения ежегодных профилактических осмотров обязательного контингента и по возможности – других групп населения; в) активное наблюдение и оздоровление больных и лиц с факторами риска; г) обследование, лечение и реабилитация больных по обращаемости, динамическое наблюдение за ними; д) создание автоматизированных информационных систем и банков данных по диспансерному учету населения: (выберите правильную комбинацию ответов)

- а) а, б
- б) а, в, д
- в) б, в, г, д
- г) а, б, в
- д) б, г, д

205. Процесс формирования здорового образа жизни включает: (выберите один правильный ответ)

- а) информирование населения о факторах риска, формирование убежденности в необходимости сохранении здоровья
- б) обследование на наличие ВИЧ и вирусного гепатита С
- в) повышение материального благосостояния
- г) назначение профилактического лечения, вакцинопрофилактика
- д) снижение показателя летальности

206. Эндогенными гипертензивными веществами, способствующими подъему артериального давления путем повышения периферического сосудистого сопротивления, являются: (выберите один правильный ответ)

- а) брадикинин
- б) катехоламины, ангиотензин-П
- в) ацетилхолин, гемоглобин, фибриноген
- г) серотонин
- д) предсердный натрийуретический пептид

207. Препаратом, обладающим проонкогенными свойствами, считается: (выберите один правильный ответ)

- а) ампициллин
- б) парацетамол
- в) эналаприл
- г) нитроспрей
- д) азатиоприн

208. Какой из перечисленных симптомов не является характерным для рака молочной железы: (выберите один правильный ответ)

- а) умбиликация

- б) лимонная корка
- в) втяжение соска
- г) гиперпигментация соска и ареолы
- д) изъязвление

209. При маммографии признаком мастопатии является: (выберите один правильный ответ)

- а) тени узловой формы
- б) усиление рисунка и удвоение контуров протоков
- в) перидуктальный фиброз
- г) микро-и макрокальцинаты
- д) все вышеуказанное

210. Показания к направлению на обследование при подозрении на рак желудка: (выберите один правильный ответ)

- а) дисфагия, диспепсия, анемия
- б) дисфония, дисфагия, боли в горле
- в) кашель, лихорадка, кровохарканье
- г) запоры, метеоризм, желтуха
- д) похудание, отеки на ногах, цианоз конечностей

211. Относительно ранние симптомы рака легкого: (выберите один правильный ответ)

- а) кашель, кровохарканье, одышка
- б) понос, опоясывающие боли в животе, слабость
- в) учащенное мочеиспускание, лихорадка
- г) желтуха, гепатомегалия
- д) анемия, дизурия

212. Антигипертензивный препарат первой линии при лечении артериальной гипертензии у беременной: (выберите один правильный ответ)

- а) фуросемид
- б) эналаприл
- в) бисопролол
- г) метилдопа
- д) валсартан

213. При лечении инфекции мочевых путей у беременных противопоказано применение: (выберите один правильный ответ)

- а) гентамицина
- б) пенициллина
- в) ампициллина
- г) цефазолина
- д) амоксиклава

214. Течение беременности у больных сахарным диабетом осложняется: (выберите один правильный ответ)

- а) невынашиванием беременности
- б) поздними гестозами
- в) многоводием
- г) антенатальной гибелью плода
- д) всем вышеперечисленным

215. Для тяжелой формы нефропатии беременной нехарактерно: (выберите один правильный ответ)

- а) повышение А/Д свыше 40% от исходного уровня
- б) содержание белка в моче свыше 3 г/л
- в) выраженные отеки

г) головная боль

216. Применение ингибиторов АПФ при беременности возможно: (выберите один правильный ответ)

- а) только на ранних сроках
- б) только во втором и третьем триместрах
- в) на любом сроке
- г) противопоказано на любом сроке
- д) возможно в индивидуальном порядке

217. Каждое посещение участкового терапевта у беременной определяют: (выберите один правильный ответ)

- а) ЭКГ и общий анализ мочи
- б) кровь на ВИЧ и флюорографию
- в) температуру и массу тела, АД
- г) окружность живота и сердцебиение плода
- д) группу крови и резус-фактор

218. Анемия у беременных чаще всего является: (выберите один правильный ответ)

- а) апластической
- б) фолиеводефицитной
- в) железодефицитной
- г) постгеморрагической
- д) токсической

219. Какие виды лихорадок выделяют в зависимости от выраженности температуры: (выберите один правильный ответ)

- а) субфебрильная (37-37,9° С)
- б) умеренная (38-39,9° С)
- в) высокая (40-40,9° С)
- г) гиперпирексия (41° С и выше)
- д) все перечисленные виды

220. В основе лихорадки неясного генеза могут лежать следующие состояния: (выберите один правильный ответ)

- а) заболевания инфекционно-воспалительного характера
- б) онкологические заболевания
- в) системные заболевания соединительной ткани
- г) психогенные лихорадки
- д) все вышеперечисленное

221. По продолжительности лихорадка может быть: (выберите один правильный ответ)

- а) острой, подострой, молниеносной
- б) ундулирующей, персистирующей
- в) приступообразной, гиподинамической
- г) хронической, эволюционной

222. Лихорадка, характеризующаяся чередованием лихорадочных и безлихорадочных периодов называется: (выберите один правильный ответ)

- а) ремиттирующей
- б) интермиттирующей
- в) волнообразной
- г) возвратной

223. Лихорадка, характеризующаяся значительными суточными колебаниями температуры тела в пределах 1,5-2°C, но при этом температура не снижается до нормальных цифр: (выберите один правильный ответ)

- а) ремиттирующая
- б) интермиттирующая
- в) ундулирующая
- г) гектическая

224. «Коробочный звук» при хроническом бронхите указывает на развитие: (выберите один правильный ответ)

- а) острой пневмонии
- б) эмфиземы
- в) пневмосклероза
- г) бронхоэктазов
- д) плеврита

225. Какой отдел верхних дыхательных путей реже поражается при аденовирусной инфекции: (выберите один правильный ответ)

- а) слизистая носа
- б) слизистая глотки
- в) слизистая гортани
- г) слизистая бронхов

226. Какие противовирусные химиопрепараты применяются при гриппе: (выберите один правильный ответ)

- а) озельтамивир, ингавирин
- б) противогриппозный иммуноглобулин, кагоцел
- в) амоксициллин, виферон
- г) гриппферон, парацетамол
- д) ремантадин, нистатин

227. Для какой формы респираторной вирусной инфекции конъюнктивит является одним из основных симптомов: (выберите один правильный ответ)

- а) грипп
- б) парагрипп
- в) аденовирусная инфекция
- г) РС-инфекция
- д) риновирусная инфекция

228. Для какой респираторной вирусной инфекции ларингит является одним из основных симптомов: (выберите один правильный ответ)

- а) парагрипп
- б) РС-инфекция
- в) аденовирусная инфекция
- г) грипп
- д) риновирусная инфекция

229. Синдромы, характерные для аденовирусной инфекции: (выберите один правильный ответ)

- а) цефалгии, миалгии, артралгии
- б) лимфаденопатия, умеренная интоксикация, конъюнктивит
- в) гастроэнтерита с тошнотой, рвотой, болью в животе
- г) ринофаринготонзиллит
- д) ларингит

230. При аденовирусной инфекции выделяют следующие синдромы: (выберите один правильный ответ)

- а) острого ринофарингита, фаринго-конъюнктивальной лихорадки, острого конъюнктивита или кератоконъюнктивита
- б) пневмонии, колита
- в) гастроэнтерита с тошнотой, рвотой, болью в животе
- г) цефалгии, миалгии, артралгии
- д) ларингита, мезаденита с диареей

231. При хроническом бронхите отмечается кашель с мокротой: (выберите один правильный ответ)

- а) 2 месяца не менее 2-х лет
- б) 3 месяца не менее 2-х лет
- в) 3 месяца не менее 3-х лет
- г) 4 месяца не менее 3-х лет

232. Хронический бронхит следует лечить антибиотиками: (выберите один правильный ответ)

- а) в осенне-зимний период
- б) длительно
- в) не следует лечить вообще
- г) при выделении гнойной мокроты
- д) при появлении кровохарканья

233. Осложнение хронического бронхита: (выберите один правильный ответ)

- а) абсцесс легкого
- б) плеврит
- в) туберкулез
- г) эмфизема легких

234. Симптомы при ОРВИ, требующие неотложной врачебной помощи: (выберите один правильный ответ)

- а) температура выше 40 градусов, не реагирующая на прием жаропонижающих препаратов, нарушение сознания (спутанное сознание, обмороки)
- б) головная боль, снижение аппетита
- в) менее пяти дней лихорадка, слабость, потливость
- г) запоры
- д) диффузная головная боль

235. При лечении пневмонии применяют: (выберите один правильный ответ)

- а) антибиотики, отхаркивающие
- б) антибиотики, диуретики
- в) бронхолитики, глюкокортикостероиды
- г) бронхолитики, диуретики

236. Укажите факторы, способствующие развитию пневмоний: (выберите один правильный ответ)

- а) перенесенные ОРВИ
- б) иммунодефициты (в том числе СПИД)
- в) сердечно-сосудистые заболевания
- г) обструкция дыхательного дерева
- д) сахарный диабет
- е) все перечисленное

237. Назовите легочные осложнения крупозной пневмонии: (выберите один правильный ответ)

- а) миокардит, перикардит

- б) рак легкого, бронхиальная астма
- в) инфаркт миокарда, плеврит
- г) перитонит
- д) эмпиема плевры, абсцесс легкого

238. При пневмонии, вызванной микоплазмой, следует назначать: (выберите один правильный ответ)

- а) тетрациклин
- б) эритромицин
- в) пенициллин
- г) цефалоспориин III поколения
- д) бисептол
- е) гентамицин

239. Наиболее частой причиной тромбоэмболии легочной артерии является: (выберите один правильный ответ)

- а) инфекционный эндокардит
- б) варикозное расширение вен пищевода
- в) *тромбофлебит глубоких вен нижних конечностей*
- г) мерцательная аритмия
- д) перелом шейки бедра

240. Ведущее показание к назначению глюкокортикоидов при пневмониях: (выберите один правильный ответ)

- а) тяжелое течение с выраженной интоксикацией
- б) выраженная гипертермия
- в) вялое рассасывание инфильтрата
- г) наличие бронхоспастического синдрома
- д) появление выпота в плевральной полости

241. Для лечения бронхиальной астмы используются следующие препараты, кроме: (выберите один правильный ответ)

- а) кромогликата натрия
- б) глюкокортикостероидов
- в) β_2 -адреностимуляторов
- г) метилксантинов
- д) протеолитических ферментов

242. Укажите аэрозоли, содержащие М-холинолитик: (выберите один правильный ответ)

- а) атровент, беродуал
- б) бекотид
- в) формотерол, сальбутамол
- г) дитек

243. Основными принципами лечения астматического статуса являются: (выберите один правильный ответ)

- а) парентеральное введение кортикостероидов
- б) парентеральное введение бронхорасширяющих средств
- в) ингаляция кислорода
- г) применение высоких доз ингаляционных кортикостероидов
- д) все перечисленное

244. Базисным (основным) препаратом для лечения бронхиальной астмы является: (выберите один правильный ответ)

- а) сальбутамол

- б) фенотерол (беротек)
- в) беклометазона дипропионат
- г) ипратропиума бромид (атровент)
- д) эуфиллин

245. При ночных приступах удушья (возникающих в 3 - 4 часа ночи) больному лучше рекомендовать на ночь: (выберите один правильный ответ)

- а) ингаляцию беротека
- б) ингаляцию сальметерола (серевент)
- в) 2 таблетки супрастина
- г) 2 таблетки преднизолона
- д) 2 таблетки бромгексина

246. К методам профилактики при наличии бронхиальной астмы можно отнести: (выберите один правильный ответ)

- а) прекращение контакта с аллергеном
- б) отказ от курения
- в) своевременную и адекватную терапию
- г) своевременное проведение вакцинации от гриппа
- д) все перечисленные варианты

247. Бронхиальная астма отличается от сердечной: (выберите один правильный ответ)

- а) ночными приступами удушья
- б) связью приступов с положением тела
- в) кашлем в конце приступа
- г) эффектом от приема β_2 -адреномиметиков
- д) всем перечисленным

248. Какой из перечисленных препаратов не относится к периферическим вазодилататорам: (выберите один правильный ответ)

- а) пропранолол
- б) каптоприл
- в) нифедипин
- г) молсидомин
- д) празозин

249. Осложнением гипертонической болезни является все, кроме: (выберите один правильный ответ)

- а) острой правожелудочковой недостаточности
- б) гипертонического криза
- в) сердечной астмы
- г) острого нарушения мозгового кровообращения

250. Клиническими проявлениями гипертонического криза являются все показатели, кроме: (выберите один правильный ответ)

- а) внезапного резкого подъема артериального давления
- б) резкой головной боли, головокружения
- в) сердцебиения, колющих болей в области сердца
- г) нарушения зрения, тошноты, рвоты
- д) появления быстро нарастающих отеков

251. Комбинация препаратов: антагонисты кальция (АК) + тиазидные диуретики (ТД) не используется при: (выберите один правильный ответ)

- а) ИСАГ (изолированная систолическая АГ)
- б) пожилыми больными
- в) ИБС
- г) атеросклерозе сонных и коронарных артерий

252. Комбинация препаратов: тиазидные диуретики (ТД) + β -адреноблокаторы (β -АБ) не используется при: (выберите один правильный ответ)

- а) ХСН
- б) перенесенном ИМ
- в) тахикардии
- г) пожилым возрастом
- д) сахарном диабете

253. При остром ИМ в сыворотке крови раньше других возрастает уровень активности: (выберите один правильный ответ)

- а) АсТ
- б) КФК
- в) ЛДГ
- г) миоглобина

254. Тромболизис при ОИМ эффективен в первые: (выберите один правильный ответ)

- а) 14 часов
- б) 6 часов
- в) 16 часов
- г) только в первые 2 часа

255. Какой из перечисленных препаратов является антиагрегантом: (выберите один правильный ответ)

- а) сустак-форте
- б) аспирин
- в) фенилин
- г) дихлотиазид
- д) нифедипин

256. Возникновение медикаментозной АВ-блокады возможно при применении: (выберите один правильный ответ)

- а) нифедипина
- б) эналаприла
- в) нитросорбида
- г) хинидина, верапамила

257. Перечислите заболевания, при которых часто встречается фибрилляция предсердий: (выберите один правильный ответ)

- а) митральные пороки сердца, ИБС, тиреотоксикоз
- б) язвенная болезнь желудка
- в) бронхиальная астма
- г) миокардиты, системные васкулиты

258. Назначение варфарина у больных с фибрилляцией предсердий должно проводиться под контролем: (выберите один правильный ответ)

- а) протромбинового времени
- б) МНО
- в) АЧТВ
- г) фибриногена

259. Причинами возникновения наджелудочковых экстрасистолии могут быть: (выберите один правильный ответ)

- а) эмоциональное возбуждение, применение симпатомиметиков, нарушение электролитного баланса
- б) сон, анабиоз
- в) низкое АД,

г) язвенная болезнь желудка

260. Препарат пропafenон – антиаритмический препарат: (выберите один правильный ответ)

- а) IС класса
- б) II класса
- в) IV класса

261. Выдача и продление листка нетрудоспособности за прошедшее время может осуществляться: (выберите один правильный ответ)

- а) не может ни при каких обстоятельствах
- б) при жалобах пациента и его указании на заболевание
- в) самостоятельно участковым терапевтом
- г) в исключительных случаях по решению врачебной комиссии при обращении гражданина в медицинскую организацию или посещении его медицинским работником на дому
- д) фельдшером отдаленного врачебного участка

262. С помощью вагусных проб возможно купирование нарушения ритма: (выберите один правильный ответ)

- а) трепетание предсердий
- б) фибрилляции предсердий
- в) пароксизмальная наджелудочковая тахикардия
- г) желудочковая экстрасистолия

263. Периодические профилактические осмотры проводятся: (выберите один правильный ответ)

- а) при приеме на работу
- б) рабочим промышленных предприятий с вредными и опасными условиями труда; работникам ведущих профессий сельскохозяйственного производства, дети и подростки, юноши допризывного возраста
- в) при увольнении с работы
- г) инвалидам детства
- д) беременным женщинам в женской консультации

264. Основные направления медицинской реабилитации: (выберите один правильный ответ)

- а) ранняя диагностика болезни (травмы), своевременная госпитализация , полноценное лабораторно-инструментальное обследование
- б) хирургическое лечение заболевания
- в) вакцинопрофилактика
- г) инфузионное введение лекарственных препаратов
- д) паллиативная помощь

265. Для кардиогенного шока характерны все признаки, кроме: (выберите один правильный ответ)

- а) снижения АД менее 90/50 мм рт. ст.
- б) тахикардии
- в) акроцианоза
- г) снижения общего периферического сосудистого сопротивления
- д) олигоанурии

266. Наиболее характерный ЭКГ-признак крупноочагового ИМ: (выберите один правильный ответ)

- а) горизонтальная депрессия ST
- б) депрессия ST выпуклостью кверху и несимметричный зубец T

- в) подъем ST
- г) глубокие зубцы Q
- д) зубцы QS

267. Наиболее характерный ЭКГ-признак трансмурального ИМ: (выберите один правильный ответ)

- а) горизонтальная депрессия ST
- б) депрессия ST выпуклостью кверху и несимметричный зубец T
- в) подъем ST
- г) глубокие зубцы Q
- д) зубцы QS

268. Все изменения крови характерны для острой стадии ИМ, кроме: (выберите один правильный ответ)

- а)увеличения уровня миоглобина
- б) увеличения активности аспарагиновой трансаминазы
- в) появления С-реактивного белка
- г) увеличения активности щелочной фосфатазы
- д) увеличения МВ-фракции КФК

269. Больным, перенесшим ИМ, назначают длительно аспирин, потому что он: (выберите один правильный ответ)

- а) снижает протромбиновый индекс
- б) препятствует агрегации тромбоцитов
- в) лизирует образовавшиеся тромбы
- г) ингибирует внутренний механизм свертывания крови
- д) механизм положительного действия аспирина неизвестен

270. Улучшить отдаленный прогноз у больных, перенесших крупноочаговый инфаркт миокарда, позволяют: (выберите один правильный ответ)

- а) нитраты
- б) непрямые антикоагулянты
- в) β-блокаторы
- г) все перечисленное
- д) ни один из перечисленных

271. При миокардите: (выберите один правильный ответ)

- а) обязательным проявлением является сердечная недостаточность
- б) лечение следует всегда начинать с преднизолона
- в) температура повышается не всегда, единственным симптомом могут быть нарушения ритма и проводимости сердца
- г) боли в области сердца никогда не носят ангинозный характер
- д) возбудителем всегда является вирус Коксаки

272. «Золотым стандартом» диагностики миокардита является: (выберите один правильный ответ)

- а) сцинтиграфия миокарда в покое
- б) эхокардиография
- в) сцинтиграфия миокарда с нагрузкой
- г) эндомиокардиальная биопсия
- д) электрокардиография

273. Лабораторные изменения при миокардите включают: (выберите один правильный ответ)

- а) увеличение СОЭ, появление С-реактивного белка, повышение уровня МВ-фракции креатинфосфаткиназы в крови
- б) гипербилирубинемия

- в) дислипидемию
- г) анемию, тромбоцитопению
- д) креатининемию, гиперурикемию

274. Дилатационная кардиомиопатия характеризуется расширением: (выберите один правильный ответ)

- а) всех отделов сердца
- б) левого предсердия
- в) правого желудочка
- г) правого предсердия
- д) корня аорты

275. Наиболее информативным методом исследования для диагностики гипертрофической кардиомиопатии является: (выберите один правильный ответ)

- а) ЭКГ
- б) ЭхоКГ
- в) рентгенологическое исследование органов грудной клетки
- г) коронароангиография
- д) сцинтиграфия сердца с таллием

276. Какое из нижеперечисленных изменений, выявленных при биохимическом исследовании крови, не характерно для миокардита: (выберите один правильный ответ)

- а) гиперфибриногенемия
- б) обнаружение С-реактивного протеина
- в) гиперхолестеринемия
- г) повышение концентрации КФК и ее изофермента – ФК-МВ
- д) диспротеинемия

277. Выберите метод исследования, имеющий решающее значение в дифференциальной диагностике миокардита и ИБС: (выберите один правильный ответ)

- а) эхокардиография
- б) электрокардиография
- в) коронарография
- г) внутрисердечное электрофизиологическое исследование
- д) ни один из перечисленных

278. При каком из пороков сердца наиболее значительно увеличивается левое предсердие: (выберите один правильный ответ)

- а) стеноз легочной артерии
- б) незарощенный Боталлов проток
- в) митральный стеноз
- г) стеноз устья аорты
- д) недостаточность 3-створчатого клапана

279. Появление ортопноэ является признаком: (выберите один правильный ответ)

- а) ОРВИ
- б) инсульта
- в) приступа стенокардии
- г) недостаточности кровообращения I степени
- д) острой дыхательной недостаточности, инфаркта миокарда

280. Укажите основные проявления недостаточности кровообращения по малому кругу: (выберите один правильный ответ)

- а) увеличение печени, периферические отеки
- б) уменьшение диуреза, асцит
- в) кашель, влажные хрипы в нижних отделах легких

- г) тахикардия, аритмия
- д) повышение АД, головные боли

281. Какой ритм наиболее характерен для аускультации сердца у больных с выраженной сердечной недостаточностью: (выберите один правильный ответ)

- а) ритм «перепела»
- б) протодиастолический ритм галопа
- в) пресистолический ритм галопа
- г) систолический ритм галопа
- д) дополнительный перикард-тон

282. К основным медикаментозным средствам лечения ХСН относят: (выберите один правильный ответ)

- а) ингибиторы АПФ и антибиотики
- б) ингибиторы АПФ, блокаторы кальциевых каналов и нитраты
- в) ингибиторы АПФ и антиаритмики
- г) ингибиторы АПФ, сердечные гликозиды, диуретики, бета-блокаторы
- д) ингибиторы АПФ, антикоагулянты, ацетилсалициловую кислоту

283. Назовите парентеральные стимуляторы желудочной секреции: (выберите один правильный ответ)

- а) стрептокиназа, урокиназа
- б) адреналин
- в) гисталог
- г) серотонин
- д) пентагастрин , гистамин

284. Перечислите жалобы больных, наиболее характерные для патологии поджелудочной железы: (выберите один правильный ответ)

- а) боль в нижних отделах живота, запоры
- б) запоры
- в) снижение аппетита, боли опоясывающего характера
- г) горечь во рту
- д) отрыжка, изжога

285. Какие препараты относятся к H₂-гистаминовым блокаторам: (выберите один правильный ответ)

- а) циметидин, гистидин, ранитидин
- б) атропин, белладонна, метацин
- в) гастрोцепин
- г) пантопразол, редуксин
- д) омепразол

286. β-клетки поджелудочной железы продуцируют: (выберите один правильный ответ)

- а) брадикинины
- б) серотонин
- в) гистамин
- г) инсулин
- д) панкреатический полипептид

287. Укажите препарат преимущественно холинолитического действия: (выберите один правильный ответ)

- а) аллохол
- б) холензим
- в) сорбит
- г) но-шпа
- д) атропин

288. Для лечения желчнокаменной болезни применяют: (выберите один правильный ответ)

- а) альмагель
- б) ранитидин
- в) омепразол
- г) хенофальк

289. Назовите основной этиологический фактор острого гломерулонефрита: (выберите один правильный ответ)

- а) стафилококк
- б) клебсиелла
- в) β -гемолитический стрептококк группы А
- г) синегнойная палочка
- д) пневмококк

290. Назовите показания для назначения глюкокортикоидов при остром гломерулонефрите: (выберите один правильный ответ)

- а) отеки
- б) наличие стабильного выраженного нефротического синдрома
- в) артериальная гипертония
- г) макрогематурия

291. Длительность лечения при хроническом гломерулонефрите составляет: (выберите один правильный ответ)

- а) несколько недель
- б) 2-3 месяца
- в) 6 месяцев
- г) от 6 месяцев до 2 лет

292. Для острого гломерулонефрита характерны следующие клинические симптомы: (выберите один правильный ответ)

- а) отеки + олигурия + гипертония + азотемия+ протеинурия + гематурия
- б) отеки + полиурия + гипертония + азотемия + протеинурия + гематурия
- в) отеки + олигурия + гипертония + азотемия + протеинурия + лейкоцитурия
- г) отеки + гипертония + протеинурия + бактериурия

293. Пункционная биопсия почки при остром гломерулонефрите показана: (выберите один правильный ответ)

- а) при обычном течении
- б) при затяжном течении
- в) при возникновении осложнений (острая сердечная недостаточность, отек легких, тромбозы, ОПН, и др.)

294. Какой из клинических вариантов течения хронического гломерулонефрита встречается наиболее часто: (выберите один правильный ответ)

- а) гематурический
- б) нефротический
- в) латентный
- г) гипертонический
- д) смешанный

295. Иммуносупрессивная терапия при хроническом гломерулонефрите включает в себя: (выберите один правильный ответ)

- а) кортикостероиды, цитостатики
- б) нитраты, стимуляторы имидазолиновых рецепторов
- в) антибиотики

- г) нестероидные противовоспалительные препараты
- д) антикоагулянты

296. Лабораторным показателем, позволяющим предположить наличие нефротического синдрома, (выберите несколько правильных ответов)

- а) величина клубочковой фильтрации
- б) уровень креатинина крови
- в) величина протеинурии
- г) уровень холестерина сыворотки
- д) уровень гемоглобина крови

297. Первым мероприятием у больного с клиникой острого пиелонефрита должно быть: (выберите один правильный ответ)

- а) массивная антибактериальная терапия
- б) цистоскопия
- в) 3-стаканная проба
- г) УЗИ почек

298. Для лечения острого пиелонефрита целесообразнее использовать: (выберите один правильный ответ)

- а) пенициллин
- б) амоксилав
- в) сульфодимезин
- г) эритромицин

299. Какой симптом острого пиелонефрита обычно исчезает первым на фоне антибактериальной терапии: (выберите один правильный ответ)

- а) лихорадка
- б) лейкоцитурия
- в) бактериурия
- г) боли в поясничной области

300. От чего зависит темная и желтоватая окраска кожи при хронической почечной недостаточности: (выберите один правильный ответ)

- а) от повышения прямого билирубина
- б) от повышения непрямого билирубина
- в) от нарушения выделения урохромов
- г) от нарушения выработки конъюгированного билирубина
- д) от нарушения секреции билирубина

301. Группа антибиотиков, чаще вызывающая острую почечную недостаточность: (выберите один правильный ответ)

- а) пенициллины
- б) цефалоспорины
- в) аминогликозиды
- г) макролиды
- д) тетрациклин

302. Причины острой почечной недостаточности при назначении нестероидных противовоспалительных препаратов: (выберите один правильный ответ)

- а) потеря внутриклеточного Ca^{++}
- б) препятствие синтезу простагландинов
- в) массивная протеинурия
- г) нарушение гемодинамики
- д) снижение почечного кровотока

303. Укажите мочегонные, обладающие калийсберегающим действием: (выберите один правильный ответ)

- а) верошпирон , триамтерен
- б) этакриновая кислота
- в) маннитол
- г) фуросемид
- д) торасемид

304. К «петлевым» диуретикам относятся: (выберите один правильный ответ)

- а) гипотиазид
- б) фуросемид
- в) индапамид
- г) маннитол
- д) верошпирон

305. Причиной смерти больных, находящихся на гемодиализе, является: (выберите один правильный ответ)

- а) инфаркт миокарда
- б) геморрагический перикардит
- в) гиперкалиемия
- г) сосудистые поражения ЦНС
- д) инфекции
- е) отек легкого
- ж) все ответы правильные

306. Наиболее быстро ХПН развивается при следующей патологии: (выберите один правильный ответ)

- а) поликистозе почек
- б) мочекаменной болезни
- в) латентном гломерулонефрите
- г) экстракапиллярном гломерулонефрите
- д) хроническом пиелонефрите

307. Частота диспансерных осмотров у больных с терминальной стадией ХПН: (выберите один правильный ответ)

- а) 2 раза в год
- б) 3 раза в год
- в) 4 раза в год
- г) 6 раз в год или иногда ежемесячно

308. Уровень гемоглобина в норме составляет: (выберите один правильный ответ)

- а) 110 – 130 г/л – у мужчин, 100 – 120 г/л – у женщин
- б) 110 – 140 г/л – у мужчин, 100 – 120 г/л – у женщин
- в) 120 – 150 г/л – у мужчин, 110 – 130 г/л – у женщин
- г) 130 – 160 г/л – у мужчин, 120 – 140 г/л – у женщин

309. В норме показатели сывороточного железа в крови составляют: (выберите один правильный ответ)

- а) мужчины: 10,7 – 30,4 мкмоль/л, женщины: 9 – 23,3 мкмоль/л
- б) мужчины: 15 – 20 мкмоль/л, женщины: 10 – 15 мкмоль/л
- в) мужчины: 20 – 40 мкмоль/л, женщины: 15 – 30 мкмоль/л
- г) мужчины: 25 – 45 мкмоль/л, женщины: 20 – 35 мкмоль/л

310. Выберите анемию, чаще встречающуюся в пожилом возрасте: (выберите один правильный ответ)

- а) аутоиммунная гемолитическая анемия

- б) железодефицитная анемия
- в) апластическая анемия
- г) В₁₂-дефицитная анемия
- д) наследственный микросфероцитоз

311. Желтуха, гепато- и спленомегалия, темный цвет мочи наблюдаются при анемии: (выберите один правильный ответ)

- а) апластической
- б) гемолитической
- в) железодефицитной
- г) постгеморрагической
- д) сидероахрестической

312. Перечислите этапы лечения железодефицитной анемии: (выберите один правильный ответ)

- а) определение уровня железа в крови
- б) насыщение фолиевой кислотой, оксигенация, терапия перераспределения
- в) определение доз препарата железа
- г) купирование анемии, терапия насыщения, профилактика рецидивов
- д) профилактика кровотечений, гемодиализ, переливание крови и ее компонентов

313. Перечислите симптомы, характерные для гемолитических анемий: (выберите один правильный ответ)

- а) желтуха, спленомегалия, интенсивная окраска мочи и кала
- б) слабость, менингеальные симптомы
- в) боли в груди стреляющего характера, дизурия
- г) парез кишечника, запор
- д) кровотечение

314. Перечислите виды анемий, относящиеся к группе мегалобластных: (выберите один правильный ответ)

- а) аутоиммунная гемолитическая анемия
- б) железодефицитная анемия
- в) сидероахрестическая анемия
- г) постгеморрагическая
- д) анемия вследствие дефицита фолиевой кислоты, В₁₂-дефицитная анемия

315. Госпитализации подлежат беременные с уровнем гемоглобина: (выберите один правильный ответ)

- а) 100 г/л
- б) 90 г/л
- в) 80 г/л
- г) 70 г/л и ниже

316. Длительность лечение беременных с анемией составляет: (выберите один правильный ответ)

- а) 2 недели
- б) 1 месяц
- в) 2 – 3 месяца
- г) 3 – 4 месяца
- д) с момента установления диагноза и до родов

317. Выберите основной ранний критерий эффективности терапии В12-дефицитной анемии: (выберите один правильный ответ)

- а) повышение концентрации гемоглобина
- б) нормализация содержания эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в периферической крови
- в) полное исчезновение мегалобластов из костного мозга

- г) ретикулоцитарный криз
- д) гемолитический криз

318. Укажите анемию, при которой показана спленэктомия: (выберите один правильный ответ)

- а) апластическая
- б) анемия хронических заболеваний
- в) В₁₂-дефицитная
- г) железодефицитная
- д) гемолитическая

319. Выберите изменения в биохимическом анализе крови, которые могут быть выявлены у больных В₁₂-дефицитной анемией: (выберите один правильный ответ)

- а) повышение уровня непрямого билирубина
- б) повышение активности ферментов АЛТ, АСТ
- в) снижение уровня сывороточного железа
- г) гиперкалиемия
- д) гипокалиемия

320. Длительность лечения железодефицитной анемии у пожилых пациентов будет составлять: (выберите один правильный ответ)

- а) 2 недели
- б) 1 месяц
- в) 2 – 3 месяца
- г) 3 – 4 месяца

321. Длительность лечения железодефицитной анемии будет определяться: (выберите один правильный ответ)

- а) исчезновением жалоб пациента
- б) нормализацией показателей гемоглобина, железа в крови, восстановлением запасов железа в организме
- в) нормализацией АД, ЦВД
- г) нормализацией показателей витамина В₁₂ в крови
- д) нормализацией показателей уровня фолатов в крови

322. Выберите препарат, назначаемый для лечения В₁₂-дефицитной анемии: (выберите один правильный ответ)

- а) цианокобаламин
- б) преднизолон
- в) гепарин
- г) метилдопа
- д) ферум-лек

323. К дегенеративно-дистрофическим поражениям суставов можно отнести: (выберите один правильный ответ)

- а) подагру, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит
- б) остеохондроз, деформирующий остеоартроз, болезнь Пертеса
- в) болезнь Рейтера, болезнь Бехтерева, болезнь Пертеса
- г) ревматоидный артрит, остеохондроз, анкилозирующий спондилоартрит

324. Заболевание, характеризующееся воспалением суставов, связанным с образованием кристаллов мочевой кислоты (уратов) на фоне гиперурикемии: (выберите один правильный ответ)

- а) ревматоидный артрит
- б) деформирующий остеоартроз
- в) болезнь Бехтерева
- г) подагра

325. При остром приступе подагры наиболее целесообразно назначить лечение: (выберите один правильный ответ)

- а) хондропротекторы
- б) нестероидные противовоспалительные средства
- в) кортикостероиды
- г) иммобилизация пораженных суставов
- д) холод на стопы

326. Главными органами-мишенями при подагре являются: (выберите один правильный ответ)

- а) сердце и суставы
- б) суставы и почки
- в) сердце и почки
- г) суставы и околосуставные ткани

327. Перечислите эндогенные факторы риска развития остеоартроза: (выберите один правильный ответ)

- а) возраст, травмы, дефекты развития, спортивная деятельность
- б) возраст, пол, наследственная предрасположенность, избыточная масса тела, травмы
- в) пол, возраст, дефекты развития, наследственная предрасположенность
- г) травмы, профессиональная деятельность, спортивная активность, избыточная масса тела

328. Укажите заболевание, для которого будет характерен «феномен геля»: (выберите один правильный ответ)

- а) подагра
- б) болезнь Бехтерева
- в) болезнь Пертеса
- г) остеоартроз
- д) ревматоидный артрит

329. Перечислите характерные рентгенологические признаки остеоартроза: (выберите один правильный ответ)

- а) «симптом пробойника»
- б) образование костных каверн
- в) патологические переломы диафизов
- г) субхондральный остеосклероз, остеофитоз
- д) сужение суставной щели

330. Перечислите характерные рентгенологические признаки ревматоидного артрита: (выберите один правильный ответ)

- а) гиперостозы
- б) образование костных каверн
- в) значительное разрушение хряща, околосуставной эпифизарный остеопороз, краевая узурация костей
- г) «симптом пробойника»
- д) патологические переломы диафизов

331. Назовите рентгенологический признак подагры: (выберите один правильный ответ)

- а) околосуставной эпифизарный остеопороз
- б) образование костных каверн
- в) значительное разрушение хряща
- г) «симптом пробойника»
- д) краевая узурация костей

332. Выберите особенности, характерные для остеоартроза: (выберите один правильный ответ)

- а) болезненность, крепитация, утренняя скованность в суставах, деформации (варусные и вальгусные)
- б) сильнейшая, пульсирующая, жгучая, рвущая боль в одном или нескольких суставах, возникающая во второй половине ночи
- в) псориатические бляшки в волосистой части головы, точечные поражения ногтевых пластинок, «пальцы-сосиски» мутилирующий синдром
- г) деформация пальцев типа «лебединая шея», латеральная девиация пальцев ног – «ласты моржа», киста Бейкера, серопозитивный и серонегативный ревматоидный фактор

333. Для купирования острого приступа подагры необходимо назначить: (выберите один правильный ответ)

- а) НПВП, колхицин, глюкокортикоиды
- б) глюкокортикоиды, ингибиторы АПФ, колхицин
- в) ингибиторы протонной помпы, диуретики, глюкокортикоиды
- г) блокаторы H₂-гистаминарных рецепторов, сердечные гликозиды, НПВП

334. Хондропротекторы необходимо назначать при: (выберите один правильный ответ)

- а) болезни Бехтерева
- б) болезни Рейтера
- в) ревматоидном артрите
- г) болезни Пертеса
- д) остеоартрозе

335. Укажите локализацию ревматоидных узелков: (выберите один правильный ответ)

- а) кожа ушных раковин
- б) лицо
- в) разгибательная поверхность крупных суставов
- г) область лодыжек
- д) тыльная поверхность мелких суставов, область ахилловых сухожилий

336. Выберите классическое проявление подагры: (выберите один правильный ответ)

- а) «ревматоидная кисть»
- б) поражение I плюснефалангового сустава
- в) «пальцы-сосиски»
- г) «феномен геля»

337. Тофусы представляют собой отложения в тканях кристаллов: (выберите один правильный ответ)

- а) уратов натрия
- б) оксалатов кальция
- в) пирофосфата кальция
- г) гидроксиапатита кальция
- д) мочевины

338. Листок нетрудоспособности при заболеваниях и травмах выдается со дня: (выберите один правильный ответ)

- а) установления нетрудоспособности при врачебном освидетельствовании
- б) заболевания
- в) обращения к врачу в лечебно-профилактическое учреждение
- г) посещения врача в лечебно-профилактическом учреждении

339. При оказании скорой и неотложной медицинской помощи лекарственные средства назначаются: (выберите один правильный ответ)

- а) санитаркой

- б) врачом отделения неотложной помощи (помощи на дому) амбулаторно-поликлинического учреждения, врачом выездной бригады скорой медицинской помощи
- в) главным врачом ЛПУ
- г) заведующим отделением
- д) врачом дневного стационара

340. Профилактикой ИБС является: (выберите один правильный ответ)

- а) курение
- б) дыхательная гимнастика
- в) занятия физкультурой, отказ от курения
- г) диета с высоким содержанием белка
- д) чтение специальной литературы

341. Диспансеризация в настоящее время проводится: (выберите один правильный ответ)

- а) в один этап
- б) в два этапа
- в) в три этапа
- г) в 4 этапа
- д) нет этапности

342. Диспансеризации подлежит взрослое население работающее и неработающее с кратностью: (выберите один правильный ответ)

- а) 1 раз в год
- б) 1 раз в 2 года
- в) 1 раз в три года
- г) 1 раз в 4 года
- д) ежемесячно

343. Принципы отбора лиц, подлежащих диспансеризации: (выберите один правильный ответ)

- а) социальный и медицинский
- б) медицинский и финансовый
- в) профессиональный и национальный
- г) возрастной и половой
- д) административный и религиозный

344. По результатам диспансеризации оформляется: (выберите один правильный ответ)

- а) учетная форма №131/у «Карта учета диспансеризации»
- б) лист нетрудоспособности
- в) направление на МСЭ
- г) направление на госпитализацию
- д) карта амбулаторного пациента

345. Комбинация длительно-действующих β_2 -агонистов+глюкокортикостероидов в одном ингаляторе (выберите один правильный ответ)

- а) беродуал
- б) фенотерол
- в) флексотид
- г) эуфиллин/беродуал
- д) формотерол/будесонид

346. ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ Ф. № 058/У СОСТАВЛЯЕТСЯ НА

- А) любое обращение в поликлинику
- Б) оперативное вмешательство
- В) необычную реакцию на прививку
- Г) первичный патронаж новорожденного

347. Классификация ХОБЛ по степени тяжести основана на данных (выберите один правильный ответ)

- а) объективного исследования пациента
- б) жалоб и анамнеза
- в) спирометрического исследования
- г) микробиологического исследования мокроты
- д) рентгенологического исследования органов грудной полости

348. Факторы риска ХОБЛ: (выберите один правильный ответ)

- а) частые ангины, ОРВИ
- б) бытовые аллергены
- в) частые ангины
- г) продукты сгорания некоторых видов бытового топлива, курение (до 90%)
- д) хронический ринит

349. Дифференциальная диагностика БА и ХОБЛ основана на: (выберите один правильный ответ)

- а) интеграции основных данных клиники, результатов функциональных и лабораторных тестов
- б) тщательно собранном анамнезе
- в) разнице в жалобах
- г) бронхоскопическом исследовании
- д) данных рентгенографии органов грудной полости

350. При проведении спирометрии ХОБЛ проявляется: (выберите один правильный ответ)

- а) инспираторным ограничением воздушного потока вследствие понижения сопротивления дыхательных путей
- б) экспираторным ограничением воздушного потока вследствие повышения сопротивления дыхательных путей
- в) увеличением ЖЕЛ
- г) рестриктивным типом нарушения дыхания
- д) уменьшением ООЛ (остаточного объема легких)

351. Бронхоскопическое исследование при ХОБЛ служит: (выберите один правильный ответ)

- а) дополнительным методом при диагностике ХОБЛ для исключения других заболеваний и состояний, протекающих с аналогичными симптомами.
- б) основным методом диагностики ХОБЛ
- в) не применяется для диагностики ХОБЛ
- г) применяется только вместе с биопсией бронхов
- д) применяется вместе с бронхографией

352. Ингаляционные кортикостероиды, применяемые при ХОБЛ: (выберите один правильный ответ)

- а) будесонид
- б) ипратропиума бромид
- в) беродуал
- г) фенотерол
- д) преднизолон

353. ХОБЛ наиболее часто дифференцируют с: (выберите один правильный ответ)

- а) бронхиальной астмой
- б) язвенной болезнью желудка
- в) ГЭРБ
- г) ОРВИ
- д) лимфолейкозом

354. В практической деятельности участкового терапевта используются: (выберите один правильный ответ)

- а) медицинская карта амбулаторного больного (УФ – 025/У), направление на консультацию, госпитализацию и во вспомогательные кабинеты (УФ-028/У)
- б) журнал регистрации отказов в вызове «Скорой помощи»
- в) медицинская карта стационарного больного(УФ-030/У)
- г) справка о прививках (УФ-031/У)
- д) журнал регистрации беременных (УФ-012)

355. Относительно ранние симптомы рака легкого: (выберите один правильный ответ)

- а) кашель, кровохарканье, одышка
- б) боли в ногах, слабость
- в) учащенное мочеиспускание, одышка
- г) желтуха, похудание
- д) парезы, параличи

356. Наиболее частые изменения со стороны системы крови у беременных: (выберите один правильный ответ)

- а) развитие лейкоза
- б) лейкомоидные реакции
- в) железодефицитные анемии
- г) тромбоцитоз
- д) панцитопения

357. Основные жалобы со стороны пищеварительной системы при нормально протекающей беременности: (выберите один правильный ответ)

- а) диарея
- б) урчание в животе
- в) синдром мальабсорбции
- г) сухость во рту
- д) изжога

358. У беременной женщины возник острый гломерулонефрит. Нормальное течение беременности, родов, рождение здорового ребенка в этом случае: (выберите один правильный ответ)

- а) возможно
- б) невозможно
- в) невозможно при наличии пиелонефрита
- г) невозможно при наличии злокачественной артериальной гипертензии

359. Препаратом выбора при артериальной гипертензии у беременной является: (выберите один правильный ответ)

- а) каптоприл
- б) гипотиазид
- в) метилдопа
- г) нифедипин
- д) папазол

360. Препаратом выбора при лечении гестационного пиелонефрита является: (выберите один правильный ответ)

- а) эритромицин
- б) ципрофлоксацин
- в) цефтриаксон
- г) амоксициллин плюс клавулановая кислота
- д) канефрон

- 361. Лечение острого ревматического процесса у беременной обязательно включает: (выберите один правильный ответ)**
- а) назначение глюкокортикостероидов
 - б) постельный режим
 - в) назначение мочегонных
 - г) хирургическое лечение порока сердца
 - д) прерывание беременности
- 362. Показанием к прерыванию беременности у беременной с патологией почек является: (выберите один правильный ответ)**
- а) хронический пиелонефрит в стадии обострения
 - б) хронический гломерулонефрит, гематурическая форма
 - в) поликистозная болезнь почек
 - г) туберкулез единственной почки
 - д) нефрэктомия в анамнезе
- 363. В план ведения беременной с гломерулонефритом входит: (выберите один правильный ответ)**
- а) осмотр окулистом при взятии на учет по беременности и в 28-30 недель
 - б) общий анализ мочи – еженедельно
 - в) измерение АД на сроке 20 и 30-32 недели беременности
 - г) ежедневный осмотр нефрологом
 - д) ЭКГ в 20 недель беременности
- 364. Для купирования гипертонического криза у беременных применяют: (выберите один правильный ответ)**
- а) каптоприл
 - б) дибазол с папаверином внутримышечно
 - в) раствор сульфата магния парентерально или клонидин
 - г) раствор сульфата магния энтерально или лозартан
 - д) пентамин парентерально
- 365. Что нехарактерно для постоянной лихорадки: (выберите один правильный ответ)**
- а) постоянный характер повышения температуры
 - б) уровень температуры выше 39° С
 - в) суточные колебания температуры менее 1° С
 - г) суточные колебания температуры более 1° С
 - д) гипотермия
- 366. Больные неосложненной формой гриппа являются заразными: (выберите один правильный ответ)**
- а) до 12-го дня болезни
 - б) до 5-го дня болезни
 - в) до 2-х недель болезни
 - г) до 9-го дня болезни
- 367. Основная причина развития острого бронхита: (выберите один правильный ответ)**
- а) алкоголизм
 - б) курение
 - в) ОРВИ
 - г) переохлаждение
- 368. Какой антибиотик является средством выбора при эмпирической антибактериальной терапии коммунальной (внебольничной) пневмонии до верификации диагноза: (выберите один правильный ответ)**
- а) тетрациклин
 - б) стрептомицин

- в) защищенный пенициллин / эритромицин
- г) цефалоспорин
- д) гентамицин

369. Эозинофилия в мокроте наиболее характерна для: (выберите один правильный ответ)

- а) хронического бронхита
- б) острого бронхита
- в) бронхиальной астмы
- г) пневмонии
- д) туберкулеза легких

370. К клиническим проявлениям приступа удушья при бронхиальной астме относится все, кроме: (выберите один правильный ответ)

- а) экспираторной одышки
- б) розовой пены изо рта
- в) дистанционных хрипов
- г) сухих хрипов
- д) непродуктивного кашля

371. Бронхиальной астме способствует: (выберите один правильный ответ)

- а) блокада α -адренергической системы
- б) гиперчувствительность β -адренергической системы
- в) блокада холинергической системы
- г) нарушение равновесия α и β -адренергической систем
- д) все перечисленное

372. Для профессиональной бронхиальной астмы характерно все, кроме: (выберите один правильный ответ)

- а) эффекта элиминации (периодичность респираторных симптомов с улучшением состояния в выходные дни и в отпускной период)
- б) установленной бытовой аллергии
- в) эффекта реэкспозиции (ухудшение субъективного состояния и увеличение выраженности респираторных симптомов после возвращения на рабочее место – контакта с аллергенами)
- г) обратимого характера бронхиальной обструкции (кашля, одышки и свистящего затрудненного дыхания)

373. Синдром "рикошета" при астматическом статусе это: (выберите один правильный ответ)

- а) функциональная блокада β -адренергических рецепторов при применении β_2 -адреностимуляторов;
- б) накопление вязкой мокроты в дилатированных бронхах;
- в) трансудация жидкости из капилляров в легочную ткань;
- г) отхождение большого количества мокроты.

374. Показанием для госпитализации при гипертонической болезни является: (выберите правильное сочетание ответов) 1. гипертонический криз 2-го типа, 2. отек легких, 3. транзиторная ишемическая атака, 4. Острый коронарный синдром - ОКС, 5. гипертонический криз 1-го типа

- а) 1, 5
- б) 1, 2, 3, 4
- в) 2, 4, 5
- г) 3, 4, 5
- д) 3, 5

375. При недостаточном гипотензивном эффекте монотерапии ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента какой из диуретических препаратов предпочтительнее добавить больному с артериальной гипертензией: (выберите один правильный ответ)

- а) фуросемид

- б) триамтерен
- в) верошпирон
- г) урегит
- д) гипотиазид

376. Какие лекарственные препараты могут вызвать повышение АД: (выберите один правильный ответ)

- а) антагонисты кальция
- б) диуретики
- в) глюкокортикостероиды
- г) β -блокаторы

377. Для лечения синдрома «артериальной гипертензии» часто назначают: (выберите один правильный ответ)

- а) ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента
- б) блокаторы **КАЛИЕВЫХ** каналов
- в) блокаторы ионов водорода
- г) сердечные гликозиды

378. Нейролептанальгезия – это: (выберите один правильный ответ)

- а) введение больному фентанила с дроперидолом
- б) введение морфина
- в) введение трамала
- г) введение седуксена и димедрола

379. Нитраты в остром периоде ИМ: (выберите один правильный ответ)

- а) уменьшают зону повреждения
- б) показаны при кардиогенном шоке
- в) показаны при остром перикардите
- г) показаны для лечения резорбционно-некротического процесса

380. Какое осложнение ИМ наиболее часто встречается в первые сутки и строго НЕ зависит от величины зоны поражения: (выберите один правильный ответ)

- а) кардиогенный шок
- б) отек легких
- в) разрыв сердца
- г) формирования аневризмы сердца
- д) аритмии сердца
- е) фибринозный перикардит

381. Наиболее информативным инструментальным методом для постановки диагноза кардиомиопатии является: (выберите один правильный ответ)

- а) ЭКГ
- б) ЭхоКГ
- в) рентгенография органов грудной полости

382. Диспансеризация (диспансерный метод) – это: (выберите один правильный ответ)

- а) метод ежеквартального осмотра участковым терапевтом прикрепленного контингента
- б) метод постоянного наблюдения за хроническими больными на закрепленном участке, направленный на выявление обострений хронических болезней
- в) метод длительного обследования всех пациентов пожилого и старческого возраста на закрепленном участке
- г) метод раннего выявления онкологических заболеваний
- д) метод активного динамического наблюдения за состоянием здоровья населения, направленный на укрепление здоровья и повышение трудоспособности, обеспечение правильного физического

развития и предупреждение заболеваний путем проведения комплекса лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий

383. Дневной стационар осуществляет следующие функции: 1) выполнение трансфузии крови и ее компонентов; 2) оказание медицинской помощи в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи больным с заболеваниями терапевтического профиля, не требующими круглосуточного медицинского наблюдения; 3) лечение больных, выписанных из стационара под наблюдение врача-терапевта участкового и хирурга поликлиники либо врача общей практики (семейного врача) после оперативных вмешательств в случае необходимости проведения лечебных мероприятий, требующих наблюдения медицинским персоналом в течение нескольких часов в условиях медицинской организации; 4) круглосуточное наблюдение за тяжелыми пациентами; 5) оказание плановой помощи больным туберкулезом легких.: (выберите правильную комбинацию ответов)

- а) 1, 2
- б) 1, 3, 5
- в) 3, 4, 5
- г) 2, 3
- д) 4, 5

384. Назовите признаки интоксикации сердечными гликозидами: (выберите один правильный ответ)

- а) рвота
- б) понос
- в) брадикардия
- г) бессонница
- д) все правильно

385. Укажите препарат из группы нитратов: (выберите один правильный ответ)

- а) верапамил
- б) дигоксин
- в) фуросемид
- г) изосорбида динитрат
- д) клофелин

386. Когда верапамил может быть использован при лечении сердечной недостаточности: (выберите один правильный ответ)

- а) нетяжелая сердечная недостаточность при ИБС
- б) больные с неизменным сердечным выбросом и нарушением диастолической функции сердца, частая желудочковая экстрасистолия
- в) частая желудочковая экстрасистолия даже при тяжелой сердечной недостаточности
- г) частая наджелудочковая экстрасистолия даже при тяжелой сердечной недостаточности
- д) дигиталисная интоксикация

387. Какой антиаритмический препарат является наименее безопасным и достаточно эффективным при лечении тахиаритмий, вызванных дигиталисной интоксикацией: (выберите один правильный ответ)

- а) новокаинамид
- б) лидокаин
- в) изоптин
- г) индерал
- д) хинидин

388. Признаком декомпенсации ХСН является: (выберите один правильный ответ)

- а) гепатомегалия
- б) кардиомегалия
- в) гидроторакс
- г) острый отек легких

д) отеки нижних конечностей

389. Какая проба позволяет выявить снижение клубочковой фильтрации при хроническом гломерулонефрите: (выберите один правильный ответ)

- а) проба по Нечипоренко
- б) проба Зимницкого
- в) проба Реберга-Тареева
- г) проба Аддиса-Каковского
- д) проба Амбурже

390. Критерием степени тяжести нефротического синдрома является: (выберите один правильный ответ)

- а) величина протеинурии, степень гипоальбуминемии
- б) степень артериальной гипертензии
- в) выраженность отеков
- г) наличие осложнений

391. Лейкоцитурия нехарактерна для: (выберите один правильный ответ)

- а) острого уретроцистита
- б) пиелонефрита
- в) туберкулёза почек
- г) гломерулонефрита
- д) простатита

392. Термин «дизурия» в терапевтической практике означает: (выберите один правильный ответ)

- а) учащенное безболезненное мочеиспускание
- б) затруднение мочеиспускания
- в) учащенное болезненное мочеиспускание
- г) нарушение мочеиспускания

393. Какой симптом появляется у больного хроническим пиелонефритом при развитии вторично-сморщенной почки: (выберите один правильный ответ)

- а) макрогематурия
- б) дизурия
- в) артериальная гипертензия
- г) отёки

394. При хроническом пиелонефрите поражаются следующие структурные элементы почек: (выберите один правильный ответ)

- а) капсула
- б) лоханки и чашечки
- в) клубочковый аппарат
- г) канальцы

395. Основными механизмами развития анемии при ХПН являются: (выберите один правильный ответ)

- а) уменьшение продукции эритропоэтина
- б) уменьшение ответа костного мозга
- в) гемолиз эритроцитов
- г) все выше перечисленное

396. Выберите анемию, для которой характерен «лакированный язык»: (выберите один правильный ответ)

- а) апластическая
- б) анемия хронических заболеваний

- в) В₁₂-дефицитная
- г) железодефицитная
- д) гемолитическая

397. Перечислите причины, которые могут вызывать дефицит цианокобаламина в организме: (выберите правильное сочетание ответов) 1. ИБС, 2. функциональная печеночная недостаточность, 3. разрушение витамина В₁₂ соляной кислотой желудка, 4. атрофия слизистой оболочки желудка, 5. инвазия широким лентецом

- а) 1, 2, 3
- б) 3, 4
- в) 2, 5
- г) 1, 5
- д) 4, 5

398. Выберите схему назначения хондроитина сульфата: (выберите один правильный ответ)

- а) 200 мг 2 раза в сутки в течение 6 недель, затем 100 мг 2 раза в сутки, длительность курса – 12 месяцев
- б) 250 мг 2 раза в сутки в течение 6 недель, затем 100 мг 2 раза в сутки, длительность курса – 9 месяцев
- в) 750 мг 2 раза в сутки в течение 3 недель, затем 500 мг 2 раза в сутки, длительность курса – 6 месяцев
- г) 500 мг 2 раза в сутки в течение 3 недель, затем 250 мг 2 раза в сутки, длительность курса – 6 месяцев

399. Перечислите варианты поражения почек, характерные для подагры: (выберите правильное сочетание ответов) 1. нефролитиаз, 2. хронический интерстициальный нефрит, 3. амилоидоз почек, 4. хроническая почечная недостаточность, 5. гломерулосклероз

- а) 1, 2, 4
- б) 3, 4
- в) 2, 5
- г) 3, 4, 5
- д) 1, 5

400. В норме ревматоидный фактор в крови составляет: (выберите один правильный ответ)

- а) до 5 МЕ/мл
- б) до 10 МЕ/мл
- в) до 14 МЕ/мл
- г) до 20 МЕ/мл

Эталоны ответов

1-б	2-б	3-г	4-д	5-г	6-а	7-г	8-г	9-г	10-в
11-г	12-д	13-в	14-д	15-б	16-б	17-а	18-а	19-г	20-д
21-г	22-а	23-д	24-а	25-д	26-д	27-д	28-д	29-б	30-в
31-г	32-г	33-б	34-г	35-б	36-г	37-б	38-в	39-а	40-г
41-г	42-г	43-б	44-в	45-г	46-а	47-а	48-д	49-г	50-г
51-а	52-б	53-а	54-б	55-в	56-в	57-б	58-б	59-в	60-б
61-д	62-г	63-г	64-б	65-д	66-в	67-б	68-е	69-в	70-г
71-д	72-б	73-г	74-г	75-б	76-в	77-г	78-д	79-г	80-д
81-д	82-а	83-а	84-а	85-а	86-а	87-а	88-а	89-б	90-г
91-а	92-а	93-а	94-в	95-а	96-а	97-б	98-а	99-а	100-а
101-а	102-а	103-а	104-а	105-а	106-а	107-а	108-б	109-а	110-а
111-а	112-а	113-а	114-а	115-а	116-а	117-а	118-а	119-а	120-а
121-а	122-а	123-а	124-а	125-в	126-в	127-б	128-в	129-г	130-г
131-а	132-а	133-а	134-е	135-д	136-г	137-е	138-а	139-д	140-в
141-б	142-а	143-а	144-а	145-а	146-в	147-б	148-а	149-в	150-в

151-а	152-а	153-б	154-в	155-д	156-б	157-в	158-б	159-г	160-г
161-г	162-д	163-г	164-г	165-г	166-в	167-г	168-д	169-б	170-г
171-в	172-г	173-а	174-г	175-а	176-д	177-д	178-а	179-б	180-а
181-б	182-а	183-б	184-б	185-е	186-б	187-в	188-в	189-б	190-б
191-в	192-в	193-д	194-в	195-в	196-ж	197-б	198-г	199-а	200-г
201-г	202-б	203-д	204-в	205-а	206-б	207-д	208-г	209-д	210-а
211-а	212-г	213-а	214-д	215-г	216-г	217-в	218-в	219-д	220-д
221-а	222-г	223-а	224-б	225-в	226-а	227-в	228-а	229-б	230-а
231-б	232-г	233-г	234-а	235-а	236-е	237-д	238-б	239-в	240-г
241-д	242-а	243-д	244-в	245-б	246-д	247-г	248-а	249-а	250-д
251-г	252-д	253-г	254-б	255-б	256-г	257-а	258-б	259-а	260-а
261-г	262-в	263-б	264-а	265-г	266-г	267-д	268-г	269-б	270-в
271-в	272-г	273-а	274-а	275-б	276-в	277-в	278-в	279-д	280-в
281-б	282-г	283-д	284-в	285-а	286-г	287-д	288-г	289-в	290-б
291-г	292-а	293-б	294-в	295-а	296-в	297-г	298-б	299-в	300-в
301-в	302-д	303-а	304-б	305-ж	306-г	307-г	308-г	309-а	310-г
311-б	312-г	313-а	314-д	315-г	316-д	317-г	318-д	319-а	320-г
321-б	322-а	323-б	324-г	325-б	326-б	327-в	328-г	329-г	330-в
331-г	332-а	333-а	334-д	335-д	336-б	337-а	338-а	339-б	340-в
341-б	342-в	343-а	344-а	345-д	346-в	347-в	348-г	349-а	350-б
351-а	352-а	353-а	354-а	355-а	356-в	357-д	358-г	359-в	360-г
361-д	362-г	363-а	364-в	365-г	366-в	367-в	368-в	369-в	370-б
371-б	372-б	373-а	374-б	375-д	376-в	377-а	378-а	379-а	380-д
381-б	382-д	383-г	384-д	385-г	386-б	387-б	388-г	389-в	390-а
391-г	392-в	393-в	394-б	395-г	396-в	397-д	398-в	399-а	400-в